

表 2113 身長(cm) 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	248 (0.1)	567 (0.3)	2,337 (1.1)	8,637 (4.0)	19,227 (8.8)	30,751 (14.2)	35,744 (16.5)	43,719 (20.1)	39,134 (18.0)	24,965 (11.5)	9,096 (4.2)	2,404 (1.1)	386 (0.2)	59 (0.0)	217,274 (100.0)	31,451	248,725	160.03	9.62
血液透析濾過 （％）	39 (0.1)	93 (0.2)	391 (0.8)	1,492 (3.1)	3,748 (7.8)	6,626 (13.9)	7,769 (16.3)	9,313 (19.5)	8,788 (18.4)	6,285 (13.2)	2,434 (5.1)	665 (1.4)	115 (0.2)	16 (0.0)	47,774 (100.0)	6,002	53,776	160.91	9.50
血液濾過 （％）					1 (7.7)	2 (15.4)	4 (30.8)	3 (23.1)	1 (7.7)	2 (15.4)					13 (100.0)	3	16	159.23	8.25
血液吸着透析 （％）		1 (0.1)	13 (1.0)	47 (3.6)	139 (10.7)	264 (20.4)	277 (21.4)	234 (18.0)	175 (13.5)	101 (7.8)	43 (3.3)	2 (0.2)	1 (0.1)		1,297 (100.0)	79	1,376	158.12	8.73
在宅血液透析 （％）				3 (0.7)	8 (1.8)	25 (5.6)	41 (9.3)	85 (19.2)	90 (20.3)	108 (24.4)	61 (13.8)	17 (3.8)	4 (0.9)	1 (0.2)	443 (100.0)	112	555	166.96	8.36
腹膜透析 （％）	68 (1.0)	8 (0.1)	65 (1.0)	208 (3.1)	464 (7.0)	847 (12.8)	1,043 (15.7)	1,278 (19.3)	1,257 (19.0)	891 (13.4)	394 (5.9)	89 (1.3)	10 (0.2)	4 (0.1)	6,626 (100.0)	2,143	8,769	160.74	11.58
合計 （％）	355 (0.1)	669 (0.2)	2,806 (1.0)	10,387 (3.8)	23,587 (8.6)	38,515 (14.1)	44,878 (16.4)	54,632 (20.0)	49,445 (18.1)	32,352 (11.8)	12,028 (4.4)	3,177 (1.2)	516 (0.2)	80 (0.0)	273,427 (100.0)	39,790	313,217	160.20	9.66
記載なし （％）																			
総計 （％）	355 (0.1)	669 (0.2)	2,806 (1.0)	10,387 (3.8)	23,587 (8.6)	38,515 (14.1)	44,878 (16.4)	54,632 (20.0)	49,445 (18.1)	32,352 (11.8)	12,028 (4.4)	3,177 (1.2)	516 (0.2)	80 (0.0)	273,427 (100.0)	39,790	313,217	160.20	9.66

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査