

表 2175 身長(cm) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	11	11	14	58	228	1,247	3,513	7,166	8,052	5,993	2,350	627	110	15	29,395	2,235	31,630	165.78	7.11
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.8)	(4.2)	(12.0)	(24.4)	(27.4)	(20.4)	(8.0)	(2.1)	(0.4)	(0.1)	(100.0)				
女性	26	79	365	1,390	3,388	5,153	3,980	1,809	429	66	16	7		1	16,709	1,242	17,951	152.33	6.71
(%)	(0.2)	(0.5)	(2.2)	(8.3)	(20.3)	(30.8)	(23.8)	(10.8)	(2.6)	(0.4)	(0.1)	(0.0)		(0.0)	(100.0)				
合計	37	90	379	1,448	3,616	6,400	7,493	8,975	8,481	6,059	2,366	634	110	16	46,104	3,477	49,581	160.91	9.50
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.1)	(7.8)	(13.9)	(16.3)	(19.5)	(18.4)	(13.1)	(5.1)	(1.4)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				
記載なし																			
(%)																			
総計	37	90	379	1,448	3,616	6,400	7,493	8,975	8,481	6,059	2,366	634	110	16	46,104	3,477	49,581	160.91	9.50
(%)	(0.1)	(0.2)	(0.8)	(3.1)	(7.8)	(13.9)	(16.3)	(19.5)	(18.4)	(13.1)	(5.1)	(1.4)	(0.2)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査