

表 2178 身長(cm) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	130未満	130～	135～	140～	145～	150～	155～	160～	165～	170～	175～	180～	185～	190～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	7 (0.0)	35 (0.2)	101 (0.6)	487 (3.0)	1,310 (8.0)	2,503 (15.3)	2,840 (17.3)	3,095 (18.9)	2,904 (17.7)	2,102 (12.8)	792 (4.8)	198 (1.2)	35 (0.2)	2 (0.0)	16,411 (100.0)	1,051	17,462	160.64	9.34
慢性腎盂腎炎 (%)	1 (0.2)	2 (0.4)	5 (1.1)	27 (5.9)	55 (12.0)	77 (16.8)	86 (18.8)	76 (16.6)	55 (12.0)	48 (10.5)	17 (3.7)	8 (1.8)			457 (100.0)	27	484	158.42	9.90
急速進行性糸球体腎炎 (%)		1 (0.3)	5 (1.5)	12 (3.6)	31 (9.4)	49 (14.9)	63 (19.1)	55 (16.7)	61 (18.5)	32 (9.7)	11 (3.3)	8 (2.4)	1 (0.3)		329 (100.0)	24	353	159.67	9.84
妊娠腎/妊娠中毒症 (%)			3 (0.8)	30 (8.0)	66 (17.5)	134 (35.5)	96 (25.5)	37 (9.8)	10 (2.7)	1 (0.3)					377 (100.0)	24	401	152.79	5.89
その他の分類不能の腎炎 (%)			3 (1.2)	10 (4.0)	17 (6.9)	38 (15.3)	41 (16.5)	33 (13.3)	52 (21.0)	37 (14.9)	15 (6.0)	2 (0.8)			248 (100.0)	13	261	160.91	9.62
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.1)	15 (0.8)	35 (2.0)	113 (6.4)	225 (12.7)	301 (17.0)	310 (17.5)	293 (16.6)	281 (15.9)	144 (8.1)	39 (2.2)	12 (0.7)		1,769 (100.0)	111	1,880	162.45	9.67
腎硬化症 (%)	1 (0.0)	6 (0.2)	66 (1.9)	156 (4.4)	351 (9.9)	533 (15.0)	593 (16.7)	738 (20.8)	592 (16.7)	354 (10.0)	121 (3.4)	28 (0.8)	4 (0.1)		3,543 (100.0)	277	3,820	159.17	9.45
悪性高血圧 (%)		1 (0.3)	5 (1.4)	8 (2.2)	23 (6.2)	39 (10.6)	47 (12.7)	73 (19.8)	86 (23.3)	59 (16.0)	16 (4.3)	10 (2.7)	2 (0.5)		369 (100.0)	22	391	162.46	9.46
糖尿病性腎症 (%)	20 (0.1)	18 (0.1)	91 (0.6)	407 (2.6)	1,008 (6.4)	1,761 (11.2)	2,296 (14.7)	3,217 (20.5)	3,201 (20.4)	2,400 (15.3)	932 (5.9)	259 (1.7)	45 (0.3)	13 (0.1)	15,668 (100.0)	1,292	16,960	162.15	9.35
SLE腎炎 (%)			6 (1.5)	16 (4.1)	50 (12.7)	90 (22.8)	83 (21.0)	66 (16.7)	45 (11.4)	25 (6.3)	9 (2.3)	5 (1.3)			395 (100.0)	31	426	157.19	8.88
アミロイド腎 (%)				4 (5.8)	11 (15.9)	12 (17.4)	16 (23.2)	13 (18.8)	7 (10.1)	4 (5.8)	2 (2.9)				69 (100.0)	5	74	156.70	8.45
痛風腎 (%)	1 (0.6)			3 (1.9)	6 (3.8)	7 (4.4)	21 (13.3)	43 (27.2)	44 (27.8)	23 (14.6)	8 (5.1)		2 (1.3)		158 (100.0)	8	166	163.49	9.00
先天性代謝異常による腎不全 (%)		2 (4.3)	5 (10.6)	2 (4.3)	4 (8.5)	6 (12.8)	6 (12.8)	7 (14.9)	10 (21.3)	5 (10.6)					47 (100.0)	2	49	156.17	11.71
腎・尿路結核 (%)			2 (7.1)	3 (10.7)	4 (14.3)	4 (14.3)	5 (17.9)	6 (21.4)	2 (7.1)	2 (7.1)					28 (100.0)	3	31	154.64	9.51
腎・尿路結石 (%)	1 (1.4)		2 (2.8)	3 (4.2)	5 (6.9)	12 (16.7)	13 (18.1)	12 (16.7)	11 (15.3)	5 (6.9)	7 (9.7)	1 (1.4)			72 (100.0)	7	79	159.61	10.85
腎・尿路腫瘍 (%)				2 (1.8)	4 (3.5)	12 (10.6)	19 (16.8)	30 (26.5)	28 (24.8)	11 (9.7)	6 (5.3)		1 (0.9)		113 (100.0)	6	119	162.34	7.78
閉塞性尿路障害 (%)			2 (2.0)	1 (1.0)	10 (10.1)	18 (18.2)	12 (12.1)	22 (22.2)	13 (13.1)	16 (16.2)	2 (2.0)	1 (1.0)	2 (2.0)		99 (100.0)	5	104	160.23	9.83
骨髄腫 (%)				2 (6.7)	2 (6.7)	2 (6.7)	6 (20.0)	8 (26.7)	2 (6.7)	7 (23.3)	1 (3.3)				30 (100.0)	3	33	161.10	9.71
腎形成不全 (%)	1 (0.8)	2 (1.5)	3 (2.3)	11 (8.3)	11 (8.3)	19 (14.3)	25 (18.8)	25 (18.8)	18 (13.5)	13 (9.8)	4 (3.0)	1 (0.8)			133 (100.0)	3	136	157.72	10.61
不明 (%)	4 (0.1)	16 (0.4)	50 (1.2)	185 (4.3)	402 (9.4)	635 (14.9)	692 (16.3)	794 (18.7)	776 (18.2)	455 (10.7)	192 (4.5)	49 (1.2)	4 (0.1)	1 (0.0)	4,255 (100.0)	448	4,703	159.70	9.79
再導入 (%)		2 (0.4)	2 (0.4)	7 (1.5)	34 (7.4)	56 (12.1)	73 (15.8)	111 (24.1)	84 (18.2)	54 (11.7)	32 (6.9)	5 (1.1)	1 (0.2)		461 (100.0)	22	483	161.75	9.08
その他 (%)	1 (0.1)	4 (0.4)	13 (1.2)	37 (3.5)	99 (9.3)	167 (15.6)	159 (14.9)	202 (18.9)	186 (17.4)	125 (11.7)	55 (5.1)	20 (1.9)	1 (0.1)		1,069 (100.0)	91	1,160	160.20	9.88
合計 (%)	37 (0.1)	90 (0.2)	379 (0.8)	1,448 (3.1)	3,616 (7.8)	6,399 (13.9)	7,493 (16.3)	8,973 (19.5)	8,480 (18.4)	6,059 (13.1)	2,366 (5.1)	634 (1.4)	110 (0.2)	16 (0.0)	46,100 (100.0)	3,475	49,575	160.91	9.50
記載なし (%)						1 (25.0)		2 (50.0)	1 (25.0)						4 (100.0)	2	6	162.25	6.70
総計 (%)	37 (0.1)	90 (0.2)	379 (0.8)	1,448 (3.1)	3,616 (7.8)	6,400 (13.9)	7,493 (16.3)	8,975 (19.5)	8,481 (18.4)	6,059 (13.1)	2,366 (5.1)	634 (1.4)	110 (0.2)	16 (0.0)	46,104 (100.0)	3,477	49,581	160.91	9.50

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査