

表 2237 透析後体重(kg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	48	54	2,695	25,276	51,638	36,792	15,113	5,533	2,055	738	303	176	140,421	4,019	144,440	59.75	12.32
(%)	(0.0)	(0.0)	(1.9)	(18.0)	(36.8)	(26.2)	(10.8)	(3.9)	(1.5)	(0.5)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
女性	39	738	15,893	32,700	18,278	6,458	1,991	670	229	68	29	13	77,106	2,306	79,412	48.08	10.73
(%)	(0.1)	(1.0)	(20.6)	(42.4)	(23.7)	(8.4)	(2.6)	(0.9)	(0.3)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	87	792	18,588	57,976	69,916	43,250	17,104	6,203	2,284	806	332	189	217,527	6,325	223,852	55.61	13.03
(%)	(0.0)	(0.4)	(8.5)	(26.7)	(32.1)	(19.9)	(7.9)	(2.9)	(1.0)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	87	792	18,588	57,976	69,916	43,250	17,104	6,203	2,284	806	332	189	217,527	6,325	223,852	55.61	13.03
(%)	(0.0)	(0.4)	(8.5)	(26.7)	(32.1)	(19.9)	(7.9)	(2.9)	(1.0)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査