

表 2238 透析後体重(kg) 年齢(歳)別（施設血液透析患者 透析回数週3回）

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)		2 (22.2)	2 (22.2)	1 (11.1)	4 (44.4)								9 (100.0)	1	10	43.96	12.86
15歳～ (%)		8 (1.4)	66 (11.8)	155 (27.8)	153 (27.4)	92 (16.5)	38 (6.8)	22 (3.9)	17 (3.0)	5 (0.9)	2 (0.4)		558 (100.0)	19	577	55.49	15.70
30歳～ (%)	7 (0.1)	46 (0.5)	341 (3.9)	1,335 (15.2)	2,009 (22.9)	1,944 (22.2)	1,355 (15.5)	825 (9.4)	474 (5.4)	220 (2.5)	113 (1.3)	86 (1.0)	8,755 (100.0)	249	9,004	65.50	18.40
45歳～ (%)	8 (0.0)	49 (0.1)	1,145 (3.1)	5,319 (14.5)	9,406 (25.7)	9,511 (26.0)	6,072 (16.6)	2,989 (8.2)	1,309 (3.6)	470 (1.3)	187 (0.5)	93 (0.3)	36,558 (100.0)	1,012	37,570	63.74	15.23
60歳～ (%)	37 (0.0)	195 (0.2)	6,020 (6.1)	24,327 (24.8)	34,335 (35.0)	22,635 (23.1)	7,918 (8.1)	2,119 (2.2)	450 (0.5)	107 (0.1)	30 (0.0)	10 (0.0)	98,183 (100.0)	2,759	100,942	55.99	11.36
75歳～ (%)	34 (0.0)	408 (0.6)	9,770 (14.1)	25,033 (36.1)	23,236 (33.5)	8,946 (12.9)	1,710 (2.5)	245 (0.4)	34 (0.0)	3 (0.0)			69,419 (100.0)	2,146	71,565	50.23	9.74
90歳～ (%)	1 (0.0)	84 (2.1)	1,243 (30.7)	1,806 (44.7)	773 (19.1)	122 (3.0)	11 (0.3)	2 (0.0)		1 (0.0)			4,043 (100.0)	137	4,180	44.06	8.21
合計 (%)	87 (0.0)	792 (0.4)	18,587 (8.5)	57,976 (26.7)	69,916 (32.1)	43,250 (19.9)	17,104 (7.9)	6,202 (2.9)	2,284 (1.0)	806 (0.4)	332 (0.2)	189 (0.1)	217,525 (100.0)	6,323	223,848	55.61	13.03
不明 (%)			1 (50.0)					1 (50.0)					2 (100.0)	1	3	61.25	32.17
記載なし (%)														1	1		
総計 (%)	87 (0.0)	792 (0.4)	18,588 (8.5)	57,976 (26.7)	69,916 (32.1)	43,250 (19.9)	17,104 (7.9)	6,203 (2.9)	2,284 (1.0)	806 (0.4)	332 (0.2)	189 (0.1)	217,527 (100.0)	6,325	223,852	55.61	13.03
平均	69.00	74.74	75.42	72.28	69.29	65.34	60.57	55.96	51.96	49.74	47.83	46.13	68.47	69.05	68.49		
標準偏差	13.65	15.37	11.64	11.44	11.17	11.11	10.97	10.37	9.48	8.91	8.21	7.13	12.28	12.49	12.29		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査