

表 2242 透析後体重(kg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	11	6	387	4,338	10,900	8,792	4,016	1,526	605	192	76	57	30,906	724	31,630	61.55	12.62
(%)	(0.0)	(0.0)	(1.3)	(14.0)	(35.3)	(28.4)	(13.0)	(4.9)	(2.0)	(0.6)	(0.2)	(0.2)	(100.0)				
女性	6	95	2,922	7,617	4,470	1,611	541	183	38	17	4	1	17,505	446	17,951	49.07	10.53
(%)	(0.0)	(0.5)	(16.7)	(43.5)	(25.5)	(9.2)	(3.1)	(1.0)	(0.2)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	17	101	3,309	11,955	15,370	10,403	4,557	1,709	643	209	80	58	48,411	1,170	49,581	57.04	13.33
(%)	(0.0)	(0.2)	(6.8)	(24.7)	(31.7)	(21.5)	(9.4)	(3.5)	(1.3)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	17	101	3,309	11,955	15,370	10,403	4,557	1,709	643	209	80	58	48,411	1,170	49,581	57.04	13.33
(%)	(0.0)	(0.2)	(6.8)	(24.7)	(31.7)	(21.5)	(9.4)	(3.5)	(1.3)	(0.4)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査