

表 2243 透析後体重(kg) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

年齢	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)					1 (100.0)								1 (100.0)		1	52.30	
15歳～ (%)	1 (0.5)	3 (1.6)	25 (13.1)	52 (27.2)	50 (26.2)	37 (19.4)	8 (4.2)	5 (2.6)	7 (3.7)		1 (0.5)	2 (1.0)	191 (100.0)	9	200	54.99	17.58
30歳～ (%)		10 (0.4)	89 (3.1)	449 (15.7)	686 (24.0)	641 (22.4)	454 (15.9)	265 (9.3)	143 (5.0)	66 (2.3)	28 (1.0)	26 (0.9)	2,857 (100.0)	60	2,917	65.31	17.71
45歳～ (%)	7 (0.1)	9 (0.1)	333 (3.0)	1,739 (15.8)	2,796 (25.5)	2,796 (25.5)	1,837 (16.7)	884 (8.1)	386 (3.5)	118 (1.1)	43 (0.4)	27 (0.2)	10,975 (100.0)	231	11,206	63.33	15.10
60歳～ (%)	3 (0.0)	24 (0.1)	1,319 (5.8)	5,545 (24.5)	7,921 (35.0)	5,281 (23.3)	1,891 (8.4)	500 (2.2)	105 (0.5)	23 (0.1)	8 (0.0)	3 (0.0)	22,623 (100.0)	534	23,157	56.20	11.31
75歳～ (%)	6 (0.1)	43 (0.4)	1,382 (12.3)	3,942 (35.1)	3,804 (33.9)	1,623 (14.5)	362 (3.2)	54 (0.5)	2 (0.0)	2 (0.0)			11,220 (100.0)	307	11,527	51.08	9.86
90歳～ (%)		12 (2.2)	161 (29.6)	228 (41.9)	112 (20.6)	25 (4.6)	5 (0.9)	1 (0.2)					544 (100.0)	29	573	45.00	8.76
合計 (%)	17 (0.0)	101 (0.2)	3,309 (6.8)	11,955 (24.7)	15,370 (31.7)	10,403 (21.5)	4,557 (9.4)	1,709 (3.5)	643 (1.3)	209 (0.4)	80 (0.2)	58 (0.1)	48,411 (100.0)	1,170	49,581	57.04	13.33
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)	17 (0.0)	101 (0.2)	3,309 (6.8)	11,955 (24.7)	15,370 (31.7)	10,403 (21.5)	4,557 (9.4)	1,709 (3.5)	643 (1.3)	209 (0.4)	80 (0.2)	58 (0.1)	48,411 (100.0)	1,170	49,581	57.04	13.33
平均	63.59	71.59	72.12	69.08	66.63	63.25	59.10	54.74	50.77	49.32	48.34	45.21	65.42	66.92	65.46		
標準偏差	14.83	17.44	12.49	12.15	11.61	11.35	10.98	10.26	8.71	8.69	8.35	8.44	12.47	13.11	12.49		

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査