

表 2245 透析後体重(kg) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	7 (0.0)	40 (0.2)	1,405 (8.2)	4,895 (28.7)	5,612 (32.8)	3,410 (20.0)	1,183 (6.9)	364 (2.1)	111 (0.6)	29 (0.2)	17 (0.1)	11 (0.1)	17,084 (100.0)	378	17,462	54.77	12.03
慢性腎盂腎炎 （％）		2 (0.4)	62 (13.1)	165 (34.7)	129 (27.2)	84 (17.7)	24 (5.1)	6 (1.3)	3 (0.6)				475 (100.0)	9	484	52.11	11.57
急速進行性糸球 体腎炎 （％）			37 (10.5)	128 (36.5)	101 (28.8)	55 (15.7)	18 (5.1)	9 (2.6)		2 (0.6)	1 (0.3)		351 (100.0)	2	353	52.87	12.36
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		1 (0.3)	66 (16.8)	184 (46.9)	95 (24.2)	36 (9.2)	7 (1.8)	3 (0.8)					392 (100.0)	9	401	48.31	9.67
その他の分類不 能の腎炎 （％）		3 (1.2)	28 (10.9)	63 (24.5)	92 (35.8)	48 (18.7)	17 (6.6)	1 (0.4)	3 (1.2)	2 (0.8)			257 (100.0)	4	261	54.19	12.39
多発性嚢胞腎 （％）			87 (4.7)	440 (23.8)	638 (34.6)	439 (23.8)	169 (9.2)	53 (2.9)	15 (0.8)	4 (0.2)	1 (0.1)		1,846 (100.0)	34	1,880	57.08	11.66
腎硬化症 （％）	1 (0.0)	12 (0.3)	316 (8.5)	1,000 (26.9)	1,206 (32.5)	714 (19.2)	299 (8.0)	103 (2.8)	32 (0.9)	23 (0.6)	8 (0.2)	2 (0.1)	3,716 (100.0)	104	3,820	55.64	13.07
悪性高血圧 （％）	1 (0.3)		22 (5.7)	69 (18.0)	122 (31.8)	86 (22.4)	40 (10.4)	27 (7.0)	11 (2.9)	3 (0.8)	2 (0.5)	1 (0.3)	384 (100.0)	7	391	60.31	15.07
糖尿病性腎症 （％）	6 (0.0)	14 (0.1)	604 (3.7)	2,923 (17.7)	5,085 (30.7)	4,170 (25.2)	2,218 (13.4)	929 (5.6)	389 (2.4)	123 (0.7)	48 (0.3)	37 (0.2)	16,546 (100.0)	414	16,960	60.98	14.09
SLE腎炎 （％）		2 (0.5)	74 (17.8)	169 (40.6)	108 (26.0)	41 (9.9)	13 (3.1)	6 (1.4)	3 (0.7)				416 (100.0)	10	426	49.39	11.32
アミロイド腎 （％）			14 (19.7)	30 (42.3)	20 (28.2)	6 (8.5)	1 (1.4)						71 (100.0)	3	74	48.07	9.20
痛風腎 （％）		1 (0.6)	5 (3.0)	36 (22.0)	53 (32.3)	40 (24.4)	17 (10.4)	9 (5.5)	2 (1.2)		1 (0.6)		164 (100.0)	2	166	58.99	13.03
先天性代謝異常 による腎不全 （％）			14 (29.8)	11 (23.4)	15 (31.9)	3 (6.4)	2 (4.3)	2 (4.3)					47 (100.0)	2	49	50.03	13.22
腎・尿路結核 （％）			6 (19.4)	11 (35.5)	8 (25.8)	4 (12.9)	1 (3.2)	1 (3.2)					31 (100.0)		31	50.71	11.92
腎・尿路結石 （％）	1 (1.3)	2 (2.6)	5 (6.4)	21 (26.9)	21 (26.9)	24 (30.8)	4 (5.1)						78 (100.0)	1	79	53.53	11.89
腎・尿路腫瘍 （％）			8 (6.8)	22 (18.6)	50 (42.4)	25 (21.2)	10 (8.5)	1 (0.8)	1 (0.8)			1 (0.8)	118 (100.0)	1	119	56.50	12.42
閉塞性尿路障害 （％）			10 (9.6)	30 (28.8)	33 (31.7)	19 (18.3)	8 (7.7)	4 (3.8)					104 (100.0)		104	54.62	12.11
骨髄腫 （％）			1 (3.3)	10 (33.3)	8 (26.7)	9 (30.0)	2 (6.7)						30 (100.0)	3	33	55.39	9.35
腎形成不全 （％）		4 (3.0)	14 (10.4)	36 (26.9)	43 (32.1)	27 (20.1)	8 (6.0)	1 (0.7)	1 (0.7)				134 (100.0)	2	136	52.85	12.01
不明 （％）	1 (0.0)	14 (0.3)	414 (9.1)	1,239 (27.2)	1,440 (31.6)	841 (18.5)	388 (8.5)	134 (2.9)	59 (1.3)	18 (0.4)	2 (0.0)	5 (0.1)	4,555 (100.0)	148	4,703	55.54	13.22
再導入 （％）		3 (0.6)	21 (4.4)	159 (33.6)	154 (32.6)	83 (17.5)	38 (8.0)	11 (2.3)	3 (0.6)	1 (0.2)			473 (100.0)	10	483	54.62	11.71
その他 （％）		3 (0.3)	96 (8.5)	312 (27.5)	336 (29.7)	237 (20.9)	90 (7.9)	44 (3.9)	10 (0.9)	4 (0.4)		1 (0.1)	1,133 (100.0)	27	1,160	55.81	13.11
合計 （％）	17 (0.0)	101 (0.2)	3,309 (6.8)	11,953 (24.7)	15,369 (31.8)	10,401 (21.5)	4,557 (9.4)	1,708 (3.5)	643 (1.3)	209 (0.4)	80 (0.2)	58 (0.1)	48,405 (100.0)	1,170	49,575	57.04	13.33
記載なし （％）				2 (33.3)	1 (16.7)	2 (33.3)		1 (16.7)					6 (100.0)		6	59.25	12.50
総計 （％）	17 (0.0)	101 (0.2)	3,309 (6.8)	11,955 (24.7)	15,370 (31.7)	10,403 (21.5)	4,557 (9.4)	1,709 (3.5)	643 (1.3)	209 (0.4)	80 (0.2)	58 (0.1)	48,411 (100.0)	1,170	49,581	57.04	13.33

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査