

表 2247 体重(kg) 併用の状況別（腹膜透析患者）

併用の状況	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)														1	1		
PD単独 (%)	43 (1.0)	26 (0.6)	126 (3.0)	696 (16.6)	1,211 (28.8)	1,203 (28.6)	603 (14.4)	192 (4.6)	67 (1.6)	19 (0.5)	12 (0.3)	3 (0.1)	4,201 (100.0)	2,903	7,104	60.19	14.17
HD(F)単独.PDカテ あり (%)																	
PD.HD併用週1 HD(F) (%)			16 (1.3)	153 (12.8)	335 (27.9)	375 (31.3)	199 (16.6)	69 (5.8)	38 (3.2)	10 (0.8)	4 (0.3)	1 (0.1)	1,200 (100.0)	270	1,470	63.50	13.04
PD.HD併用週2 HD(F) (%)			3 (2.8)	16 (14.8)	25 (23.1)	31 (28.7)	19 (17.6)	7 (6.5)	3 (2.8)	1 (0.9)	3 (2.8)		108 (100.0)	24	132	64.28	15.77
PD.HD併用週3 HD(F) (%)																	
PD.HD併用週4 HD(F) (%)																	
PD.HD併用その他 (%)				10 (19.2)	20 (38.5)	14 (26.9)	5 (9.6)	2 (3.8)		1 (1.9)			52 (100.0)	10	62	59.29	11.46
合計 (%)	43 (0.8)	26 (0.5)	145 (2.6)	875 (15.7)	1,591 (28.6)	1,623 (29.2)	826 (14.9)	270 (4.9)	108 (1.9)	31 (0.6)	19 (0.3)	4 (0.1)	5,561 (100.0)	3,208	8,769	60.98	14.01
不明 (%)																	
記載なし (%)																	
総計 (%)	43 (0.8)	26 (0.5)	145 (2.6)	875 (15.7)	1,591 (28.6)	1,623 (29.2)	826 (14.9)	270 (4.9)	108 (1.9)	31 (0.6)	19 (0.3)	4 (0.1)	5,561 (100.0)	3,208	8,769	60.98	14.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査