

表 2251 体重(kg) 原疾患別（腹膜透析患者）

原疾患	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	4 (0.2)	4 (0.2)	50 (2.7)	329 (18.0)	556 (30.4)	576 (31.5)	224 (12.2)	54 (2.9)	23 (1.3)	4 (0.2)	5 (0.3)	2 (0.1)	1,831 (100.0)	999	2,830	59.74	12.51
慢性腎盂腎炎 （％）		1 (1.3)	6 (7.9)	26 (34.2)	24 (31.6)	8 (10.5)	6 (7.9)	4 (5.3)	1 (1.3)				76 (100.0)	21	97	54.21	13.49
急速進行性糸球体腎炎 （％）			1 (2.3)	12 (27.9)	22 (51.2)	5 (11.6)	2 (4.7)	1 (2.3)					43 (100.0)	23	66	54.60	9.50
妊娠腎/妊娠中毒症 （％）		1 (4.0)	1 (4.0)	7 (28.0)	8 (32.0)	6 (24.0)	2 (8.0)						25 (100.0)	2	27	53.26	10.70
その他の分類不能の腎炎 （％）	1 (1.8)	5 (9.1)	2 (3.6)	14 (25.5)	17 (30.9)	9 (16.4)	4 (7.3)	3 (5.5)					55 (100.0)	23	78	52.70	15.30
多発性嚢胞腎 （％）	5 (3.0)	1 (0.6)	4 (2.4)	28 (16.9)	47 (28.3)	48 (28.9)	24 (14.5)	6 (3.6)	2 (1.2)		1 (0.6)		166 (100.0)	97	263	58.89	15.26
腎硬化症 （％）		1 (0.1)	25 (3.6)	116 (16.6)	228 (32.6)	196 (28.0)	94 (13.4)	30 (4.3)	5 (0.7)	4 (0.6)	1 (0.1)		700 (100.0)	395	1,095	59.82	12.33
悪性高血圧 （％）			3 (4.4)	13 (19.1)	11 (16.2)	20 (29.4)	13 (19.1)	6 (8.8)	2 (2.9)				68 (100.0)	39	107	62.49	14.81
糖尿病性腎症 （％）			18 (1.0)	157 (9.0)	433 (24.7)	559 (31.9)	353 (20.2)	133 (7.6)	62 (3.5)	22 (1.3)	11 (0.6)	2 (0.1)	1,750 (100.0)	1,049	2,799	65.86	13.72
SLE腎炎 （％）			1 (3.8)	12 (46.2)	6 (23.1)	4 (15.4)	3 (11.5)						26 (100.0)	20	46	53.37	10.25
アミロイド腎 （％）		1 (10.0)		3 (30.0)	1 (10.0)	5 (50.0)							10 (100.0)	5	15	53.88	12.06
痛風腎 （％）				3 (13.6)	6 (27.3)	5 (22.7)	7 (31.8)	1 (4.5)					22 (100.0)	10	32	63.43	11.92
先天性代謝異常による腎不全 （％）	2 (16.7)		2 (16.7)		3 (25.0)	3 (25.0)	1 (8.3)		1 (8.3)				12 (100.0)	5	17	53.27	22.31
腎・尿路結核 （％）														2	2		
腎・尿路結石 （％）				3 (21.4)	5 (35.7)	4 (28.6)	2 (14.3)						14 (100.0)	7	21	57.76	10.78
腎・尿路腫瘍 （％）					5 (45.5)	3 (27.3)	3 (27.3)						11 (100.0)	3	14	61.90	8.17
閉塞性尿路障害 （％）	2 (15.4)			3 (23.1)	2 (15.4)	1 (7.7)	4 (30.8)	1 (7.7)					13 (100.0)	8	21	55.46	22.52
骨髄腫 （％）				3 (75.0)	1 (25.0)								4 (100.0)	3	7	46.20	3.35
腎形成不全 （％）	14 (29.8)	5 (10.6)	3 (6.4)	11 (23.4)	5 (10.6)	6 (12.8)		1 (2.1)	1 (2.1)	1 (2.1)			47 (100.0)	25	72	38.95	24.79
不明 （％）		4 (0.8)	15 (3.0)	96 (19.4)	163 (33.0)	122 (24.7)	62 (12.6)	23 (4.7)	8 (1.6)		1 (0.2)		494 (100.0)	348	842	59.04	12.55
再導入 （％）			1 (3.8)	9 (34.6)	8 (30.8)	5 (19.2)	2 (7.7)	1 (3.8)					26 (100.0)	29	55	55.65	11.25
その他 （％）	15 (8.9)	3 (1.8)	13 (7.7)	30 (17.9)	40 (23.8)	38 (22.6)	20 (11.9)	6 (3.6)	3 (1.8)				168 (100.0)	95	263	53.93	18.81
合計 （％）	43 (0.8)	26 (0.5)	145 (2.6)	875 (15.7)	1,591 (28.6)	1,623 (29.2)	826 (14.9)	270 (4.9)	108 (1.9)	31 (0.6)	19 (0.3)	4 (0.1)	5,561 (100.0)	3,208	8,769	60.98	14.01
記載なし （％）																	
総計 （％）	43 (0.8)	26 (0.5)	145 (2.6)	875 (15.7)	1,591 (28.6)	1,623 (29.2)	826 (14.9)	270 (4.9)	108 (1.9)	31 (0.6)	19 (0.3)	4 (0.1)	5,561 (100.0)	3,208	8,769	60.98	14.01

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査