

表 2253 体重減少量(kg) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	445	4,322	20,052	42,888	28,619	8,264	1,753	348	85	92	106,868	2,886	109,754	2.67	1.07
(%)	(0.4)	(4.0)	(18.8)	(40.1)	(26.8)	(7.7)	(1.6)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	294	3,786	20,062	27,827	8,033	1,035	134	20	9	40	61,240	1,750	62,990	2.16	0.87
(%)	(0.5)	(6.2)	(32.8)	(45.4)	(13.1)	(1.7)	(0.2)	(0.0)	(0.0)	(0.1)	(100.0)				
合計	739	8,108	40,114	70,715	36,652	9,299	1,887	368	94	132	168,108	4,636	172,744	2.48	1.03
(%)	(0.4)	(4.8)	(23.9)	(42.1)	(21.8)	(5.5)	(1.1)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	739	8,108	40,114	70,715	36,652	9,299	1,887	368	94	132	168,108	4,636	172,744	2.48	1.03
(%)	(0.4)	(4.8)	(23.9)	(42.1)	(21.8)	(5.5)	(1.1)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査