

表 2255 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	329 (0.6)	3,266 (5.9)	13,668 (24.8)	22,511 (40.8)	11,554 (20.9)	3,077 (5.6)	618 (1.1)	121 (0.2)	37 (0.1)	35 (0.1)	55,216 (100.0)	1,639	56,855	2.44	1.05
5年～ (%)	224 (0.4)	2,460 (4.4)	12,284 (22.2)	22,888 (41.4)	12,949 (23.4)	3,542 (6.4)	749 (1.4)	164 (0.3)	37 (0.1)	53 (0.1)	55,350 (100.0)	1,473	56,823	2.55	1.05
10年～ (%)	86 (0.3)	1,150 (4.1)	6,189 (22.0)	12,162 (43.3)	6,476 (23.0)	1,625 (5.8)	341 (1.2)	53 (0.2)	18 (0.1)	19 (0.1)	28,119 (100.0)	774	28,893	2.54	1.01
15年～ (%)	49 (0.3)	552 (3.8)	3,525 (24.2)	6,478 (44.5)	3,151 (21.7)	644 (4.4)	113 (0.8)	21 (0.1)	1 (0.0)	15 (0.1)	14,549 (100.0)	393	14,942	2.47	0.97
20年～ (%)	17 (0.2)	313 (4.1)	2,004 (26.4)	3,423 (45.1)	1,502 (19.8)	264 (3.5)	52 (0.7)	6 (0.1)		5 (0.1)	7,586 (100.0)	192	7,778	2.39	0.91
25年～ (%)	17 (0.4)	178 (4.6)	1,179 (30.3)	1,788 (46.0)	610 (15.7)	103 (2.6)	11 (0.3)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	3,891 (100.0)	93	3,984	2.27	0.89
30年～ (%)	9 (0.4)	99 (4.8)	728 (35.2)	899 (43.5)	295 (14.3)	34 (1.6)	2 (0.1)			3 (0.1)	2,069 (100.0)	45	2,114	2.17	0.92
35年～ (%)	6 (0.6)	72 (6.9)	402 (38.4)	453 (43.3)	103 (9.8)	9 (0.9)	1 (0.1)			1 (0.1)	1,047 (100.0)	23	1,070	2.04	0.82
40年～ (%)	2 (0.7)	18 (6.4)	135 (48.0)	113 (40.2)	12 (4.3)	1 (0.4)					281 (100.0)	4	285	1.89	0.67
合計 (%)	739 (0.4)	8,108 (4.8)	40,114 (23.9)	70,715 (42.1)	36,652 (21.8)	9,299 (5.5)	1,887 (1.1)	368 (0.2)	94 (0.1)	132 (0.1)	168,108 (100.0)	4,636	172,744	2.48	1.03
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	739 (0.4)	8,108 (4.8)	40,114 (23.9)	70,715 (42.1)	36,652 (21.8)	9,299 (5.5)	1,887 (1.1)	368 (0.2)	94 (0.1)	132 (0.1)	168,108 (100.0)	4,636	172,744	2.48	1.03
平均	7.65	8.22	9.30	9.11	8.53	7.81	7.54	7.08	6.39	9.12	8.88	8.48	8.87		
標準偏差	7.12	7.18	7.76	7.12	6.27	5.50	4.99	4.70	4.16	7.00	7.02	6.75	7.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査