

表 2258 体重減少量(kg) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	94	753	4,309	10,396	7,943	2,410	481	93	25	22	26,526	625	27,151	2.78	1.05
(%)	(0.4)	(2.8)	(16.2)	(39.2)	(29.9)	(9.1)	(1.8)	(0.4)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
女性	53	720	4,893	7,448	2,149	271	30	6	3	3	15,576	395	15,971	2.22	0.80
(%)	(0.3)	(4.6)	(31.4)	(47.8)	(13.8)	(1.7)	(0.2)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	147	1,473	9,202	17,844	10,092	2,681	511	99	28	25	42,102	1,020	43,122	2.57	1.00
(%)	(0.3)	(3.5)	(21.9)	(42.4)	(24.0)	(6.4)	(1.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	147	1,473	9,202	17,844	10,092	2,681	511	99	28	25	42,102	1,020	43,122	2.57	1.00
(%)	(0.3)	(3.5)	(21.9)	(42.4)	(24.0)	(6.4)	(1.2)	(0.2)	(0.1)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査