

表 2259 体重減少量(kg) 年齢(歳)別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

年齢	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳～ (%)	2 (1.4)	8 (5.5)	25 (17.2)	59 (40.7)	29 (20.0)	16 (11.0)	5 (3.4)		1 (0.7)		145 (100.0)	8	153	2.67	1.24
30歳～ (%)	12 (0.5)	49 (2.0)	305 (12.6)	734 (30.2)	762 (31.4)	394 (16.2)	131 (5.4)	30 (1.2)	7 (0.3)	4 (0.2)	2,428 (100.0)	47	2,475	3.15	1.20
45歳～ (%)	28 (0.3)	238 (2.4)	1,390 (14.3)	3,348 (34.4)	3,116 (32.0)	1,267 (13.0)	271 (2.8)	52 (0.5)	13 (0.1)	8 (0.1)	9,731 (100.0)	207	9,938	2.96	1.10
60歳～ (%)	66 (0.3)	651 (3.2)	4,364 (21.8)	9,166 (45.7)	4,831 (24.1)	863 (4.3)	92 (0.5)	14 (0.1)	4 (0.0)	10 (0.0)	20,061 (100.0)	479	20,540	2.51	0.91
75歳～ (%)	36 (0.4)	488 (5.2)	2,931 (31.5)	4,367 (46.9)	1,328 (14.3)	140 (1.5)	12 (0.1)	3 (0.0)	3 (0.0)	3 (0.0)	9,311 (100.0)	255	9,566	2.20	0.82
90歳～ (%)	3 (0.7)	39 (9.2)	187 (43.9)	170 (39.9)	26 (6.1)	1 (0.2)					426 (100.0)	24	450	1.87	0.72
合計 (%)	147 (0.3)	1,473 (3.5)	9,202 (21.9)	17,844 (42.4)	10,092 (24.0)	2,681 (6.4)	511 (1.2)	99 (0.2)	28 (0.1)	25 (0.1)	42,102 (100.0)	1,020	43,122	2.57	1.00
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	147 (0.3)	1,473 (3.5)	9,202 (21.9)	17,844 (42.4)	10,092 (24.0)	2,681 (6.4)	511 (1.2)	99 (0.2)	28 (0.1)	25 (0.1)	42,102 (100.0)	1,020	43,122	2.57	1.00
平均	65.44	69.13	68.99	66.70	61.94	55.92	51.13	51.04	51.54	58.08	65.21	66.71	65.25		
標準偏差	14.11	12.35	11.79	11.55	11.49	11.21	10.27	10.55	13.41	13.50	12.25	12.80	12.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査