

表 2260 体重減少量(kg) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.0未満	0.0～	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	60 (0.6)	485 (4.5)	2,311 (21.4)	4,338 (40.1)	2,577 (23.8)	795 (7.4)	180 (1.7)	42 (0.4)	13 (0.1)	11 (0.1)	10,812 (100.0)	257	11,069	2.59	1.08
5年～ (%)	40 (0.3)	406 (3.3)	2,364 (19.0)	5,185 (41.7)	3,260 (26.2)	938 (7.5)	188 (1.5)	31 (0.2)	9 (0.1)	5 (0.0)	12,426 (100.0)	348	12,774	2.67	1.01
10年～ (%)	24 (0.3)	195 (2.6)	1,456 (19.7)	3,113 (42.1)	1,962 (26.5)	544 (7.4)	81 (1.1)	17 (0.2)	3 (0.0)	4 (0.1)	7,399 (100.0)	164	7,563	2.65	0.98
15年～ (%)	9 (0.2)	135 (2.9)	1,017 (22.1)	2,036 (44.3)	1,125 (24.5)	235 (5.1)	32 (0.7)	4 (0.1)	2 (0.0)	1 (0.0)	4,596 (100.0)	100	4,696	2.54	0.91
20年～ (%)	5 (0.2)	85 (2.8)	797 (26.7)	1,362 (45.6)	610 (20.4)	103 (3.4)	20 (0.7)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	2,987 (100.0)	71	3,058	2.43	0.88
25年～ (%)	3 (0.2)	70 (3.7)	532 (28.1)	923 (48.7)	308 (16.3)	48 (2.5)	7 (0.4)	2 (0.1)		1 (0.1)	1,894 (100.0)	36	1,930	2.33	0.86
30年～ (%)	5 (0.4)	58 (5.0)	395 (34.0)	523 (45.0)	165 (14.2)	15 (1.3)	1 (0.1)				1,162 (100.0)	35	1,197	2.16	0.79
35年～ (%)	1 (0.2)	33 (5.2)	246 (39.0)	276 (43.7)	70 (11.1)	2 (0.3)	1 (0.2)			2 (0.3)	631 (100.0)	7	638	2.11	1.04
40年～ (%)		6 (3.1)	84 (43.1)	88 (45.1)	15 (7.7)	1 (0.5)	1 (0.5)				195 (100.0)	2	197	2.02	0.72
合計 (%)	147 (0.3)	1,473 (3.5)	9,202 (21.9)	17,844 (42.4)	10,092 (24.0)	2,681 (6.4)	511 (1.2)	99 (0.2)	28 (0.1)	25 (0.1)	42,102 (100.0)	1,020	43,122	2.57	1.00
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	147 (0.3)	1,473 (3.5)	9,202 (21.9)	17,844 (42.4)	10,092 (24.0)	2,681 (6.4)	511 (1.2)	99 (0.2)	28 (0.1)	25 (0.1)	42,102 (100.0)	1,020	43,122	2.57	1.00
平均	8.39	10.71	12.37	11.43	10.10	8.67	7.78	7.34	6.89	9.76	11.05	10.56	11.04		
標準偏差	7.66	9.33	9.70	8.71	7.37	6.02	5.81	5.43	5.24	10.43	8.55	8.16	8.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査