

表 2263 体重減少率(%) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	2,133	4,132	10,594	22,024	29,242	22,228	10,744	3,847	1,272	641	106,857	2,897	109,754	4.50	1.65
(%)	(2.0)	(3.9)	(9.9)	(20.6)	(27.4)	(20.8)	(10.1)	(3.6)	(1.2)	(0.6)	(100.0)				
女性	1,273	2,359	6,175	12,004	15,797	12,543	6,870	2,763	951	494	61,229	1,761	62,990	4.57	1.73
(%)	(2.1)	(3.9)	(10.1)	(19.6)	(25.8)	(20.5)	(11.2)	(4.5)	(1.6)	(0.8)	(100.0)				
合計	3,406	6,491	16,769	34,028	45,039	34,771	17,614	6,610	2,223	1,135	168,086	4,658	172,744	4.52	1.68
(%)	(2.0)	(3.9)	(10.0)	(20.2)	(26.8)	(20.7)	(10.5)	(3.9)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	3,406	6,491	16,769	34,028	45,039	34,771	17,614	6,610	2,223	1,135	168,086	4,658	172,744	4.52	1.68
(%)	(2.0)	(3.9)	(10.0)	(20.2)	(26.8)	(20.7)	(10.5)	(3.9)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査