

表 2264 体重減少率(%) 年齢(歳)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)			1 (33.3)	1 (33.3)	1 (33.3)						3 (100.0)	1	4	3.28	1.25
15歳～ (%)	8 (2.3)	8 (2.3)	23 (6.5)	54 (15.3)	76 (21.5)	78 (22.0)	58 (16.4)	26 (7.3)	15 (4.2)	8 (2.3)	354 (100.0)	14	368	5.10	1.88
30歳～ (%)	105 (1.6)	133 (2.0)	399 (6.1)	969 (14.7)	1,679 (25.5)	1,530 (23.2)	1,017 (15.4)	476 (7.2)	174 (2.6)	105 (1.6)	6,587 (100.0)	173	6,760	5.05	1.78
45歳～ (%)	489 (1.7)	823 (2.9)	2,228 (7.7)	5,255 (18.2)	7,726 (26.8)	6,687 (23.2)	3,537 (12.3)	1,364 (4.7)	483 (1.7)	240 (0.8)	28,832 (100.0)	746	29,578	4.74	1.65
60歳～ (%)	1,400 (1.8)	2,857 (3.7)	7,749 (9.9)	15,906 (20.4)	21,347 (27.4)	16,274 (20.9)	8,080 (10.4)	2,967 (3.8)	962 (1.2)	496 (0.6)	78,038 (100.0)	2,129	80,167	4.53	1.65
75歳～ (%)	1,289 (2.5)	2,487 (4.9)	5,961 (11.7)	11,187 (21.9)	13,393 (26.2)	9,671 (18.9)	4,662 (9.1)	1,678 (3.3)	562 (1.1)	272 (0.5)	51,162 (100.0)	1,491	52,653	4.34	1.69
90歳～ (%)	115 (3.7)	183 (5.9)	408 (13.1)	656 (21.1)	816 (26.2)	531 (17.1)	260 (8.4)	99 (3.2)	27 (0.9)	14 (0.5)	3,109 (100.0)	104	3,213	4.18	1.74
合計 (%)	3,406 (2.0)	6,491 (3.9)	16,769 (10.0)	34,028 (20.2)	45,038 (26.8)	34,771 (20.7)	17,614 (10.5)	6,610 (3.9)	2,223 (1.3)	1,135 (0.7)	168,085 (100.0)	4,658	172,743	4.52	1.68
不明 (%)					1 (100.0)						1 (100.0)		1	4.64	
記載なし (%)															
総計 (%)	3,406 (2.0)	6,491 (3.9)	16,769 (10.0)	34,028 (20.2)	45,039 (26.8)	34,771 (20.7)	17,614 (10.5)	6,610 (3.9)	2,223 (1.3)	1,135 (0.7)	168,086 (100.0)	4,658	172,744	4.52	1.68
平均	70.46	71.03	70.23	69.26	68.21	67.27	66.49	65.78	65.37	64.77	68.25	68.82	68.26		
標準偏差	12.36	11.44	11.42	11.61	11.92	12.19	12.64	13.17	13.51	13.97	12.10	12.29	12.11		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査