

表 2265 体重減少率(%) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	1,535 (2.8)	2,652 (4.8)	6,420 (11.6)	12,176 (22.1)	14,789 (26.8)	10,212 (18.5)	4,832 (8.8)	1,685 (3.1)	590 (1.1)	319 (0.6)	55,210 (100.0)	1,645	56,855	4.31	1.68
5年～ (%)	1,047 (1.9)	1,984 (3.6)	5,202 (9.4)	10,901 (19.7)	14,840 (26.8)	12,017 (21.7)	5,920 (10.7)	2,270 (4.1)	765 (1.4)	401 (0.7)	55,347 (100.0)	1,476	56,823	4.58	1.68
10年～ (%)	422 (1.5)	881 (3.1)	2,392 (8.5)	5,175 (18.4)	7,538 (26.8)	6,290 (22.4)	3,387 (12.0)	1,359 (4.8)	466 (1.7)	204 (0.7)	28,114 (100.0)	779	28,893	4.71	1.66
15年～ (%)	188 (1.3)	435 (3.0)	1,254 (8.6)	2,769 (19.0)	3,886 (26.7)	3,197 (22.0)	1,792 (12.3)	686 (4.7)	214 (1.5)	124 (0.9)	14,545 (100.0)	397	14,942	4.71	1.64
20年～ (%)	89 (1.2)	262 (3.5)	703 (9.3)	1,425 (18.8)	2,003 (26.4)	1,660 (21.9)	947 (12.5)	341 (4.5)	105 (1.4)	49 (0.6)	7,584 (100.0)	194	7,778	4.67	1.64
25年～ (%)	72 (1.9)	123 (3.2)	364 (9.4)	823 (21.2)	1,067 (27.4)	773 (19.9)	439 (11.3)	163 (4.2)	42 (1.1)	24 (0.6)	3,890 (100.0)	94	3,984	4.56	1.60
30年～ (%)	24 (1.2)	92 (4.4)	250 (12.1)	439 (21.2)	549 (26.5)	413 (20.0)	189 (9.1)	74 (3.6)	28 (1.4)	10 (0.5)	2,068 (100.0)	46	2,114	4.45	1.69
35年～ (%)	25 (2.4)	47 (4.5)	141 (13.5)	245 (23.4)	287 (27.4)	172 (16.4)	88 (8.4)	26 (2.5)	12 (1.1)	4 (0.4)	1,047 (100.0)	23	1,070	4.24	1.74
40年～ (%)	4 (1.4)	15 (5.3)	43 (15.3)	75 (26.7)	80 (28.5)	37 (13.2)	20 (7.1)	6 (2.1)	1 (0.4)		281 (100.0)	4	285	4.02	1.45
合計 (%)	3,406 (2.0)	6,491 (3.9)	16,769 (10.0)	34,028 (20.2)	45,039 (26.8)	34,771 (20.7)	17,614 (10.5)	6,610 (3.9)	2,223 (1.3)	1,135 (0.7)	168,086 (100.0)	4,658	172,744	4.52	1.68
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	3,406 (2.0)	6,491 (3.9)	16,769 (10.0)	34,028 (20.2)	45,039 (26.8)	34,771 (20.7)	17,614 (10.5)	6,610 (3.9)	2,223 (1.3)	1,135 (0.7)	168,086 (100.0)	4,658	172,744	4.52	1.68
平均	7.38	8.12	8.49	8.66	8.89	9.10	9.46	9.59	9.33	9.13	8.88	8.50	8.87		
標準偏差	6.58	7.13	7.31	7.16	7.04	6.81	6.89	6.78	6.64	6.54	7.02	6.76	7.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査