

表 2267 体重減少率(%) 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	11	22	47	58	46	32	13	4	1	2	236	9	245	3.71	1.71
(%)	(4.7)	(9.3)	(19.9)	(24.6)	(19.5)	(13.6)	(5.5)	(1.7)	(0.4)	(0.8)	(100.0)				
私立大学	45	44	110	197	250	198	77	28	10	4	963	17	980	4.23	1.84
(%)	(4.7)	(4.6)	(11.4)	(20.5)	(26.0)	(20.6)	(8.0)	(2.9)	(1.0)	(0.4)	(100.0)				
国立	8	16	21	53	68	68	35	15	9	3	296	41	337	4.68	1.89
(%)	(2.7)	(5.4)	(7.1)	(17.9)	(23.0)	(23.0)	(11.8)	(5.1)	(3.0)	(1.0)	(100.0)				
県市町村立	230	374	906	1,874	2,516	1,983	972	355	130	61	9,401	416	9,817	4.51	1.72
(%)	(2.4)	(4.0)	(9.6)	(19.9)	(26.8)	(21.1)	(10.3)	(3.8)	(1.4)	(0.6)	(100.0)				
社会保険	41	84	216	376	530	475	186	81	19	11	2,019	26	2,045	4.50	1.66
(%)	(2.0)	(4.2)	(10.7)	(18.6)	(26.3)	(23.5)	(9.2)	(4.0)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
厚生連	74	127	378	874	1,309	1,067	561	211	62	44	4,707	166	4,873	4.71	1.64
(%)	(1.6)	(2.7)	(8.0)	(18.6)	(27.8)	(22.7)	(11.9)	(4.5)	(1.3)	(0.9)	(100.0)				
その他公的	119	213	484	1,019	1,401	1,028	507	178	55	32	5,036	218	5,254	4.47	1.64
(%)	(2.4)	(4.2)	(9.6)	(20.2)	(27.8)	(20.4)	(10.1)	(3.5)	(1.1)	(0.6)	(100.0)				
私立総合	66	133	366	657	928	705	368	117	32	16	3,388	69	3,457	4.49	1.66
(%)	(1.9)	(3.9)	(10.8)	(19.4)	(27.4)	(20.8)	(10.9)	(3.5)	(0.9)	(0.5)	(100.0)				
私立	1,317	2,398	5,402	9,896	12,422	9,642	5,084	2,020	684	359	49,224	1,771	50,995	4.45	1.76
(%)	(2.7)	(4.9)	(11.0)	(20.1)	(25.2)	(19.6)	(10.3)	(4.1)	(1.4)	(0.7)	(100.0)				
私立診療所	1,495	3,080	8,839	19,024	25,569	19,573	9,811	3,601	1,221	603	92,816	1,925	94,741	4.57	1.63
(%)	(1.6)	(3.3)	(9.5)	(20.5)	(27.5)	(21.1)	(10.6)	(3.9)	(1.3)	(0.6)	(100.0)				
総計	3,406	6,491	16,769	34,028	45,039	34,771	17,614	6,610	2,223	1,135	168,086	4,658	172,744	4.52	1.68
(%)	(2.0)	(3.9)	(10.0)	(20.2)	(26.8)	(20.7)	(10.5)	(3.9)	(1.3)	(0.7)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査