

表 2297 体重減少率(%) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	398	807	2,443	5,464	7,532	5,776	2,739	935	302	128	26,524	627	27,151	4.56	1.58
(%)	(1.5)	(3.0)	(9.2)	(20.6)	(28.4)	(21.8)	(10.3)	(3.5)	(1.1)	(0.5)	(100.0)				
女性	227	508	1,457	3,157	4,283	3,316	1,688	633	212	93	15,574	397	15,971	4.59	1.59
(%)	(1.5)	(3.3)	(9.4)	(20.3)	(27.5)	(21.3)	(10.8)	(4.1)	(1.4)	(0.6)	(100.0)				
合計	625	1,315	3,900	8,621	11,815	9,092	4,427	1,568	514	221	42,098	1,024	43,122	4.57	1.58
(%)	(1.5)	(3.1)	(9.3)	(20.5)	(28.1)	(21.6)	(10.5)	(3.7)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	625	1,315	3,900	8,621	11,815	9,092	4,427	1,568	514	221	42,098	1,024	43,122	4.57	1.58
(%)	(1.5)	(3.1)	(9.3)	(20.5)	(28.1)	(21.6)	(10.5)	(3.7)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査