

表 2298 体重減少率(%) 年齢(歳)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

年齢	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
15歳未満 (%)															
15歳～ (%)	6 (4.1)	4 (2.8)	5 (3.4)	18 (12.4)	29 (20.0)	36 (24.8)	29 (20.0)	12 (8.3)	4 (2.8)	2 (1.4)	145 (100.0)	8	153	5.11	2.03
30歳～ (%)	31 (1.3)	57 (2.3)	142 (5.8)	409 (16.8)	617 (25.4)	575 (23.7)	363 (15.0)	144 (5.9)	63 (2.6)	27 (1.1)	2,428 (100.0)	47	2,475	4.97	1.64
45歳～ (%)	126 (1.3)	222 (2.3)	762 (7.8)	1,787 (18.4)	2,710 (27.9)	2,342 (24.1)	1,138 (11.7)	447 (4.6)	139 (1.4)	57 (0.6)	9,730 (100.0)	208	9,938	4.75	1.57
60歳～ (%)	281 (1.4)	621 (3.1)	1,902 (9.5)	4,156 (20.7)	5,747 (28.7)	4,306 (21.5)	2,089 (10.4)	657 (3.3)	217 (1.1)	83 (0.4)	20,059 (100.0)	481	20,540	4.54	1.55
75歳～ (%)	171 (1.8)	387 (4.2)	1,026 (11.0)	2,161 (23.2)	2,605 (28.0)	1,747 (18.8)	772 (8.3)	305 (3.3)	85 (0.9)	51 (0.5)	9,310 (100.0)	256	9,566	4.37	1.59
90歳～ (%)	10 (2.3)	24 (5.6)	63 (14.8)	90 (21.1)	107 (25.1)	86 (20.2)	36 (8.5)	3 (0.7)	6 (1.4)	1 (0.2)	426 (100.0)	24	450	4.20	1.56
合計 (%)	625 (1.5)	1,315 (3.1)	3,900 (9.3)	8,621 (20.5)	11,815 (28.1)	9,092 (21.6)	4,427 (10.5)	1,568 (3.7)	514 (1.2)	221 (0.5)	42,098 (100.0)	1,024	43,122	4.57	1.58
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	625 (1.5)	1,315 (3.1)	3,900 (9.3)	8,621 (20.5)	11,815 (28.1)	9,092 (21.6)	4,427 (10.5)	1,568 (3.7)	514 (1.2)	221 (0.5)	42,098 (100.0)	1,024	43,122	4.57	1.58
平均	66.79	67.91	67.40	66.36	65.36	64.14	63.29	62.58	61.64	63.08	65.21	66.71	65.25		
標準偏差	12.78	12.05	11.58	11.98	11.95	12.28	12.62	13.07	13.99	14.53	12.25	12.80	12.27		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査