

表 2301 体重減少率(%) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	1.0未満	1.0～	2.0～	3.0～	4.0～	5.0～	6.0～	7.0～	8.0～	9.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学	1	1	6	11	6	7	3	1			36	1	37	4.16	1.47
(%)	(2.8)	(2.8)	(16.7)	(30.6)	(16.7)	(19.4)	(8.3)	(2.8)			(100.0)				
私立大学	4	3	19	27	39	35	18	7	1		153	2	155	4.52	1.53
(%)	(2.6)	(2.0)	(12.4)	(17.6)	(25.5)	(22.9)	(11.8)	(4.6)	(0.7)		(100.0)				
国立	1	2	7	3	6	2	5	4			30	9	39	4.46	1.93
(%)	(3.3)	(6.7)	(23.3)	(10.0)	(20.0)	(6.7)	(16.7)	(13.3)			(100.0)				
県市町村立	25	66	164	401	496	365	182	54	18	8	1,779	38	1,817	4.49	1.54
(%)	(1.4)	(3.7)	(9.2)	(22.5)	(27.9)	(20.5)	(10.2)	(3.0)	(1.0)	(0.4)	(100.0)				
社会保険	4	18	41	71	86	94	39	12	7	2	374	14	388	4.56	1.61
(%)	(1.1)	(4.8)	(11.0)	(19.0)	(23.0)	(25.1)	(10.4)	(3.2)	(1.9)	(0.5)	(100.0)				
厚生連	15	26	57	158	266	198	113	39	11	3	886	42	928	4.70	1.54
(%)	(1.7)	(2.9)	(6.4)	(17.8)	(30.0)	(22.3)	(12.8)	(4.4)	(1.2)	(0.3)	(100.0)				
その他公的	9	22	64	153	202	166	74	27	15	3	735	23	758	4.60	1.56
(%)	(1.2)	(3.0)	(8.7)	(20.8)	(27.5)	(22.6)	(10.1)	(3.7)	(2.0)	(0.4)	(100.0)				
私立総合	23	29	101	242	296	196	101	29	13	8	1,038	10	1,048	4.46	1.63
(%)	(2.2)	(2.8)	(9.7)	(23.3)	(28.5)	(18.9)	(9.7)	(2.8)	(1.3)	(0.8)	(100.0)				
私立	192	369	1,025	1,998	2,752	2,178	1,110	416	137	54	10,231	454	10,685	4.56	1.66
(%)	(1.9)	(3.6)	(10.0)	(19.5)	(26.9)	(21.3)	(10.8)	(4.1)	(1.3)	(0.5)	(100.0)				
私立診療所	351	779	2,416	5,557	7,666	5,851	2,782	979	312	143	26,836	431	27,267	4.58	1.55
(%)	(1.3)	(2.9)	(9.0)	(20.7)	(28.6)	(21.8)	(10.4)	(3.6)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				
総計	625	1,315	3,900	8,621	11,815	9,092	4,427	1,568	514	221	42,098	1,024	43,122	4.57	1.58
(%)	(1.5)	(3.1)	(9.3)	(20.5)	(28.1)	(21.6)	(10.5)	(3.7)	(1.2)	(0.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査