

表 2331 Body Mass Index 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
施設血液透析 （％）	1,444 (0.7)	7,878 (3.8)	24,923 (11.9)	43,673 (20.9)	47,938 (23.0)	37,004 (17.7)	22,316 (10.7)	11,935 (5.7)	6,233 (3.0)	5,449 (2.6)	208,793 (100.0)	39,932	248,725	21.47	3.69
血液透析濾過 （％）	196 (0.4)	1,329 (2.9)	5,029 (10.9)	9,469 (20.5)	10,615 (23.0)	8,469 (18.3)	5,141 (11.1)	2,967 (6.4)	1,603 (3.5)	1,381 (3.0)	46,199 (100.0)	7,577	53,776	21.75	3.70
血液濾過 （％）	1 (7.7)	3 (23.1)	1 (7.7)	1 (7.7)	1 (7.7)	4 (30.8)	3 (23.1)				13 (100.0)	3	16	20.49	4.40
血液吸着透析 （％）	7 (0.5)	40 (3.1)	249 (19.4)	363 (28.2)	313 (24.4)	172 (13.4)	87 (6.8)	37 (2.9)	9 (0.7)	8 (0.6)	1,285 (100.0)	91	1,376	20.22	2.95
在宅血液透析 （％）	1 (0.3)	2 (0.6)	27 (7.4)	63 (17.4)	76 (20.9)	74 (20.4)	62 (17.1)	32 (8.8)	12 (3.3)	14 (3.9)	363 (100.0)	192	555	22.57	3.51
腹膜透析 （％）	25 (0.5)	72 (1.4)	226 (4.2)	606 (11.4)	1,103 (20.7)	1,287 (24.2)	948 (17.8)	514 (9.6)	314 (5.9)	232 (4.4)	5,327 (100.0)	3,442	8,769	23.20	3.64
合計 （％）	1,674 (0.6)	9,321 (3.6)	30,457 (11.6)	54,175 (20.7)	60,046 (22.9)	47,010 (17.9)	28,557 (10.9)	15,485 (5.9)	8,171 (3.1)	7,084 (2.7)	261,980 (100.0)	51,237	313,217	21.55	3.70
記載なし （％）															
総計 （％）	1,674 (0.6)	9,321 (3.6)	30,457 (11.6)	54,175 (20.7)	60,046 (22.9)	47,010 (17.9)	28,557 (10.9)	15,485 (5.9)	8,171 (3.1)	7,084 (2.7)	261,980 (100.0)	51,237	313,217	21.55	3.70

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査