

表 2337 Body Mass Index 原疾患別（透析患者全体）

原疾患	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎	570	3,301	11,337	18,801	19,083	13,072	6,907	3,354	1,561	1,256	79,242	14,105	93,347	20.91	3.42
（％）	(0.7)	(4.2)	(14.3)	(23.7)	(24.1)	(16.5)	(8.7)	(4.2)	(2.0)	(1.6)	(100.0)				
慢性腎盂腎炎	40	155	424	597	550	397	212	82	40	45	2,542	393	2,935	20.51	3.55
（％）	(1.6)	(6.1)	(16.7)	(23.5)	(21.6)	(15.6)	(8.3)	(3.2)	(1.6)	(1.8)	(100.0)				
急速進行性糸球体腎炎	30	130	384	547	455	286	152	51	24	22	2,081	397	2,478	20.16	3.30
（％）	(1.4)	(6.2)	(18.5)	(26.3)	(21.9)	(13.7)	(7.3)	(2.5)	(1.2)	(1.1)	(100.0)				
妊娠腎/妊娠中毒症	15	90	234	338	290	177	108	67	35	30	1,384	161	1,545	20.64	3.75
（％）	(1.1)	(6.5)	(16.9)	(24.4)	(21.0)	(12.8)	(7.8)	(4.8)	(2.5)	(2.2)	(100.0)				
その他の分類不能の腎炎	15	71	177	302	272	178	107	51	23	18	1,214	191	1,405	20.68	3.51
（％）	(1.2)	(5.8)	(14.6)	(24.9)	(22.4)	(14.7)	(8.8)	(4.2)	(1.9)	(1.5)	(100.0)				
多発性嚢胞腎	28	204	993	2,196	2,688	1,901	938	426	203	131	9,708	1,548	11,256	21.34	3.15
（％）	(0.3)	(2.1)	(10.2)	(22.6)	(27.7)	(19.6)	(9.7)	(4.4)	(2.1)	(1.3)	(100.0)				
腎硬化症	171	1,007	3,034	5,455	5,847	4,496	2,543	1,250	643	488	24,934	4,871	29,805	21.27	3.54
（％）	(0.7)	(4.0)	(12.2)	(21.9)	(23.4)	(18.0)	(10.2)	(5.0)	(2.6)	(2.0)	(100.0)				
悪性高血圧	16	71	246	385	459	414	268	167	100	89	2,215	403	2,618	22.06	3.99
（％）	(0.7)	(3.2)	(11.1)	(17.4)	(20.7)	(18.7)	(12.1)	(7.5)	(4.5)	(4.0)	(100.0)				
糖尿病性腎症	368	2,284	8,167	16,743	21,603	19,857	13,773	8,168	4,656	4,254	99,873	20,405	120,278	22.45	3.84
（％）	(0.4)	(2.3)	(8.2)	(16.8)	(21.6)	(19.9)	(13.8)	(8.2)	(4.7)	(4.3)	(100.0)				
SLE腎炎	30	150	381	531	371	207	108	55	34	21	1,888	339	2,227	19.91	3.44
（％）	(1.6)	(7.9)	(20.2)	(28.1)	(19.7)	(11.0)	(5.7)	(2.9)	(1.8)	(1.1)	(100.0)				
アミロイド腎	5	31	83	105	69	37	20	11	3		364	98	462	19.55	3.11
（％）	(1.4)	(8.5)	(22.8)	(28.8)	(19.0)	(10.2)	(5.5)	(3.0)	(0.8)		(100.0)				
痛風腎	10	23	104	197	224	176	105	48	19	18	924	151	1,075	21.42	3.47
（％）	(1.1)	(2.5)	(11.3)	(21.3)	(24.2)	(19.0)	(11.4)	(5.2)	(2.1)	(1.9)	(100.0)				
先天性代謝異常による腎不全	9	14	41	55	42	36	11	5	7	10	230	44	274	20.40	4.26
（％）	(3.9)	(6.1)	(17.8)	(23.9)	(18.3)	(15.7)	(4.8)	(2.2)	(3.0)	(4.3)	(100.0)				
腎・尿路結核		15	31	46	36	20	10	5	2	1	166	29	195	20.03	3.22
（％）		(9.0)	(18.7)	(27.7)	(21.7)	(12.0)	(6.0)	(3.0)	(1.2)	(0.6)	(100.0)				
腎・尿路結石	9	28	63	91	131	74	51	25	13	9	494	87	581	21.06	3.75
（％）	(1.8)	(5.7)	(12.8)	(18.4)	(26.5)	(15.0)	(10.3)	(5.1)	(2.6)	(1.8)	(100.0)				
腎・尿路腫瘍	3	34	93	165	181	155	97	28	17	7	780	130	910	21.19	3.27
（％）	(0.4)	(4.4)	(11.9)	(21.2)	(23.2)	(19.9)	(12.4)	(3.6)	(2.2)	(0.9)	(100.0)				
閉塞性尿路障害	5	30	101	138	149	96	47	31	12	11	620	110	730	20.86	3.51
（％）	(0.8)	(4.8)	(16.3)	(22.3)	(24.0)	(15.5)	(7.6)	(5.0)	(1.9)	(1.8)	(100.0)				
骨髄腫	2	9	32	80	49	40	16	7	2		237	54	291	20.30	2.87
（％）	(0.8)	(3.8)	(13.5)	(33.8)	(20.7)	(16.9)	(6.8)	(3.0)	(0.8)		(100.0)				
腎形成不全	7	28	80	133	120	84	48	33	16	19	568	92	660	21.11	3.96
（％）	(1.2)	(4.9)	(14.1)	(23.4)	(21.1)	(14.8)	(8.5)	(5.8)	(2.8)	(3.3)	(100.0)				
不明	245	1,215	3,248	5,360	5,467	4,042	2,315	1,239	588	483	24,202	5,695	29,897	21.06	3.64
（％）	(1.0)	(5.0)	(13.4)	(22.1)	(22.6)	(16.7)	(9.6)	(5.1)	(2.4)	(2.0)	(100.0)				
再導入	12	84	298	446	449	264	138	74	32	25	1,822	361	2,183	20.68	3.41
（％）	(0.7)	(4.6)	(16.4)	(24.5)	(24.6)	(14.5)	(7.6)	(4.1)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
その他	83	347	905	1,463	1,509	998	582	308	140	147	6,482	1,562	8,044	20.94	3.67
（％）	(1.3)	(5.4)	(14.0)	(22.6)	(23.3)	(15.4)	(9.0)	(4.8)	(2.2)	(2.3)	(100.0)				
合計	1,673	9,321	30,456	54,174	60,044	47,007	28,556	15,485	8,170	7,084	261,970	51,226	313,196	21.55	3.70
（％）	(0.6)	(3.6)	(11.6)	(20.7)	(22.9)	(17.9)	(10.9)	(5.9)	(3.1)	(2.7)	(100.0)				
記載なし	1		1	1	2	3	1		1		10	11	21	21.11	4.19
（％）	(10.0)		(10.0)	(10.0)	(20.0)	(30.0)	(10.0)		(10.0)		(100.0)				
総計	1,674	9,321	30,457	54,175	60,046	47,010	28,557	15,485	8,171	7,084	261,980	51,237	313,217	21.55	3.70
（％）	(0.6)	(3.6)	(11.6)	(20.7)	(22.9)	(17.9)	(10.9)	(5.9)	(3.1)	(2.7)	(100.0)				

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査