

表 2384 Body Mass Index 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回）

性別	14未満	14～	16～	18～	20～	22～	24～	26～	28～	30～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	56	460	2,326	5,414	6,953	5,929	3,594	2,098	1,089	904	28,823	2,807	31,630	22.18	3.57
(%)	(0.2)	(1.6)	(8.1)	(18.8)	(24.1)	(20.6)	(12.5)	(7.3)	(3.8)	(3.1)	(100.0)				
女性	134	836	2,605	3,825	3,437	2,365	1,440	806	479	455	16,382	1,569	17,951	20.99	3.82
(%)	(0.8)	(5.1)	(15.9)	(23.3)	(21.0)	(14.4)	(8.8)	(4.9)	(2.9)	(2.8)	(100.0)				
合計	190	1,296	4,931	9,239	10,390	8,294	5,034	2,904	1,568	1,359	45,205	4,376	49,581	21.75	3.71
(%)	(0.4)	(2.9)	(10.9)	(20.4)	(23.0)	(18.3)	(11.1)	(6.4)	(3.5)	(3.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	190	1,296	4,931	9,239	10,390	8,294	5,034	2,904	1,568	1,359	45,205	4,376	49,581	21.75	3.71
(%)	(0.4)	(2.9)	(10.9)	(20.4)	(23.0)	(18.3)	(11.1)	(6.4)	(3.5)	(3.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査