

表 2437 透析前BUN(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	20未満	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	237	1,525	6,167	16,392	26,388	26,615	17,472	8,235	2,811	849	260	104	107,055	2,699	109,754	61.02	15.49
(%)	(0.2)	(1.4)	(5.8)	(15.3)	(24.6)	(24.9)	(16.3)	(7.7)	(2.6)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
女性	178	1,081	3,992	9,587	14,703	14,880	9,862	4,644	1,695	504	135	65	61,326	1,664	62,990	60.64	15.87
(%)	(0.3)	(1.8)	(6.5)	(15.6)	(24.0)	(24.3)	(16.1)	(7.6)	(2.8)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
合計	415	2,606	10,159	25,979	41,091	41,495	27,334	12,879	4,506	1,353	395	169	168,381	4,363	172,744	60.88	15.63
(%)	(0.2)	(1.5)	(6.0)	(15.4)	(24.4)	(24.6)	(16.2)	(7.6)	(2.7)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				
記載なし																	
(%)																	
総計	415	2,606	10,159	25,979	41,091	41,495	27,334	12,879	4,506	1,353	395	169	168,381	4,363	172,744	60.88	15.63
(%)	(0.2)	(1.5)	(6.0)	(15.4)	(24.4)	(24.6)	(16.2)	(7.6)	(2.7)	(0.8)	(0.2)	(0.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査