

表 2500 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	34 (0.0)	667 (0.6)	3,403 (3.2)	11,060 (10.3)	24,035 (22.4)	30,910 (28.9)	22,924 (21.4)	10,390 (9.7)	3,652 (3.4)	107,075 (100.0)	2,679	109,754	10.89	2.80
女性 (%)	37 (0.1)	977 (1.6)	4,608 (7.5)	13,161 (21.5)	21,324 (34.8)	15,306 (25.0)	4,971 (8.1)	824 (1.3)	135 (0.2)	61,343 (100.0)	1,647	62,990	9.04	2.34
合計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79
記載なし (%)														
総計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査