

表 2502 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	45 (0.1)	837 (1.5)	3,592 (6.5)	9,990 (18.0)	15,903 (28.7)	13,724 (24.8)	7,417 (13.4)	2,838 (5.1)	1,049 (1.9)	55,395 (100.0)	1,460	56,855	9.73	2.82
5年～ (%)	15 (0.0)	481 (0.9)	2,441 (4.4)	7,481 (13.5)	14,571 (26.3)	15,342 (27.7)	9,646 (17.4)	4,031 (7.3)	1,426 (2.6)	55,434 (100.0)	1,389	56,823	10.36	2.80
10年～ (%)	8 (0.0)	171 (0.6)	1,022 (3.6)	3,331 (11.8)	7,093 (25.2)	8,182 (29.1)	5,354 (19.0)	2,234 (7.9)	755 (2.7)	28,150 (100.0)	743	28,893	10.58	2.73
15年～ (%)	2 (0.0)	68 (0.5)	447 (3.1)	1,531 (10.5)	3,562 (24.5)	4,492 (30.9)	2,908 (20.0)	1,216 (8.4)	330 (2.3)	14,556 (100.0)	386	14,942	10.70	2.60
20年～ (%)		36 (0.5)	186 (2.4)	795 (10.5)	1,944 (25.6)	2,418 (31.8)	1,473 (19.4)	587 (7.7)	161 (2.1)	7,600 (100.0)	178	7,778	10.68	2.61
25年～ (%)		29 (0.7)	131 (3.4)	476 (12.2)	1,097 (28.2)	1,181 (30.3)	720 (18.5)	215 (5.5)	46 (1.2)	3,895 (100.0)	89	3,984	10.33	2.61
30年～ (%)	1 (0.0)	14 (0.7)	87 (4.2)	309 (15.0)	671 (32.5)	601 (29.1)	290 (14.1)	77 (3.7)	13 (0.6)	2,063 (100.0)	51	2,114	9.85	2.38
35年～ (%)		7 (0.7)	81 (7.8)	222 (21.2)	400 (38.3)	236 (22.6)	78 (7.5)	14 (1.3)	7 (0.7)	1,045 (100.0)	25	1,070	9.05	2.28
40年～ (%)		1 (0.4)	24 (8.6)	86 (30.7)	118 (42.1)	40 (14.3)	9 (3.2)	2 (0.7)		280 (100.0)	5	285	8.49	1.92
合計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79
平均	5.23	6.64	7.50	8.03	8.80	9.29	9.44	9.31	8.60	8.88	8.71	8.87		
標準偏差	4.75	6.18	6.94	7.20	7.33	7.01	6.69	6.27	5.76	7.01	6.89	7.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査