

表 2503 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	10 (0.0)	349 (0.7)	1,675 (3.1)	5,725 (10.7)	12,923 (24.2)	15,712 (29.4)	10,639 (19.9)	4,772 (8.9)	1,693 (3.2)	53,498 (100.0)	1,289	54,787	10.76	2.77
慢性腎盂腎炎 (%)	2 (0.1)	13 (0.8)	58 (3.4)	262 (15.6)	458 (27.2)	455 (27.0)	258 (15.3)	137 (8.1)	40 (2.4)	1,683 (100.0)	32	1,715	10.27	2.74
急速進行性糸球 体腎炎 (%)	3 (0.2)	42 (3.4)	96 (7.8)	187 (15.2)	313 (25.5)	305 (24.9)	176 (14.3)	67 (5.5)	38 (3.1)	1,227 (100.0)	30	1,257	9.75	3.16
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)		2 (0.2)	21 (2.3)	119 (13.0)	304 (33.3)	298 (32.6)	141 (15.4)	25 (2.7)	3 (0.3)	913 (100.0)	18	931	10.06	2.09
その他の分類不 能の腎炎 (%)	1 (0.1)	6 (0.8)	30 (4.1)	91 (12.6)	130 (18.0)	198 (27.3)	149 (20.6)	80 (11.0)	39 (5.4)	724 (100.0)	13	737	10.95	3.07
多発性嚢胞腎 (%)	1 (0.0)	16 (0.2)	145 (2.2)	680 (10.5)	1,723 (26.5)	2,034 (31.3)	1,226 (18.9)	488 (7.5)	180 (2.8)	6,493 (100.0)	145	6,638	10.71	2.58
腎硬化症 (%)	5 (0.0)	159 (1.1)	848 (5.8)	2,477 (17.0)	4,251 (29.2)	3,669 (25.2)	2,083 (14.3)	800 (5.5)	257 (1.8)	14,549 (100.0)	333	14,882	9.86	2.73
悪性高血圧 (%)	1 (0.1)	11 (0.8)	58 (4.1)	168 (11.9)	336 (23.7)	339 (24.0)	274 (19.4)	160 (11.3)	68 (4.8)	1,415 (100.0)	36	1,451	10.84	3.02
糖尿病性腎症 (%)	18 (0.0)	680 (1.1)	3,722 (5.8)	10,919 (17.0)	18,851 (29.4)	17,192 (26.8)	9,110 (14.2)	2,910 (4.5)	787 (1.2)	64,189 (100.0)	1,703	65,892	9.80	2.66
SLE腎炎 (%)	5 (0.4)	15 (1.3)	56 (4.9)	176 (15.5)	335 (29.5)	309 (27.2)	173 (15.2)	43 (3.8)	23 (2.0)	1,135 (100.0)	33	1,168	9.88	2.82
アミロイド腎 (%)		8 (3.8)	18 (8.5)	49 (23.2)	68 (32.2)	43 (20.4)	20 (9.5)	3 (1.4)	2 (0.9)	211 (100.0)	5	216	8.89	2.76
痛風腎 (%)			11 (1.7)	51 (8.0)	141 (22.0)	190 (29.7)	154 (24.1)	68 (10.6)	25 (3.9)	640 (100.0)	12	652	11.24	2.62
先天性代謝異常 による腎不全 (%)		2 (1.3)	8 (5.3)	19 (12.7)	22 (14.7)	28 (18.7)	32 (21.3)	29 (19.3)	10 (6.7)	150 (100.0)	3	153	11.35	3.50
腎・尿路結核 (%)		2 (1.7)	6 (5.0)	25 (20.7)	36 (29.8)	36 (29.8)	12 (9.9)	4 (3.3)		121 (100.0)	2	123	9.38	2.40
腎・尿路結石 (%)		1 (0.3)	18 (5.8)	42 (13.4)	76 (24.3)	90 (28.8)	52 (16.6)	26 (8.3)	8 (2.6)	313 (100.0)	6	319	10.36	2.77
腎・尿路腫瘍 (%)	1 (0.2)	2 (0.4)	21 (4.7)	45 (10.0)	101 (22.4)	130 (28.8)	104 (23.1)	38 (8.4)	9 (2.0)	451 (100.0)	8	459	10.65	2.74
閉塞性尿路障害 (%)		14 (3.8)	16 (4.3)	72 (19.5)	84 (22.7)	83 (22.4)	55 (14.9)	29 (7.8)	17 (4.6)	370 (100.0)	7	377	10.07	3.26
骨髄腫 (%)		3 (3.5)	7 (8.1)	25 (29.1)	22 (25.6)	19 (22.1)	7 (8.1)	3 (3.5)		86 (100.0)	1	87	8.86	2.62
腎形成不全 (%)			6 (1.8)	15 (4.4)	39 (11.5)	75 (22.1)	104 (30.7)	64 (18.9)	36 (10.6)	339 (100.0)	5	344	12.50	2.79
不明 (%)	13 (0.1)	228 (1.5)	890 (6.0)	2,356 (15.9)	3,973 (26.9)	3,747 (25.3)	2,223 (15.0)	983 (6.6)	382 (2.6)	14,795 (100.0)	498	15,293	10.03	2.93
再導入 (%)		8 (0.7)	36 (3.3)	75 (6.9)	189 (17.3)	310 (28.4)	273 (25.0)	150 (13.7)	51 (4.7)	1,092 (100.0)	16	1,108	11.42	2.85
その他 (%)	11 (0.3)	83 (2.1)	265 (6.6)	641 (15.9)	983 (24.4)	954 (23.7)	630 (15.7)	335 (8.3)	119 (3.0)	4,021 (100.0)	131	4,152	10.08	3.13
合計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,219 (14.4)	45,358 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,415 (100.0)	4,326	172,741	10.22	2.79
記載なし (%)				2 (66.7)	1 (33.3)					3 (100.0)		3	7.60	1.54
総計 (%)	71 (0.0)	1,644 (1.0)	8,011 (4.8)	24,221 (14.4)	45,359 (26.9)	46,216 (27.4)	27,895 (16.6)	11,214 (6.7)	3,787 (2.2)	168,418 (100.0)	4,326	172,744	10.22	2.79

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査