

表 2504 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学		12	21	63	64	49	21	9	2	241	4	245	8.87	2.85
(%)		(5.0)	(8.7)	(26.1)	(26.6)	(20.3)	(8.7)	(3.7)	(0.8)	(100.0)				
私立大学	2	13	36	171	263	255	142	57	18	957	23	980	10.01	2.73
(%)	(0.2)	(1.4)	(3.8)	(17.9)	(27.5)	(26.6)	(14.8)	(6.0)	(1.9)	(100.0)				
国立		8	21	53	108	74	47	14	9	334	3	337	9.79	3.07
(%)		(2.4)	(6.3)	(15.9)	(32.3)	(22.2)	(14.1)	(4.2)	(2.7)	(100.0)				
県市町村立	3	59	374	1,359	2,621	2,689	1,524	537	194	9,360	457	9,817	10.21	2.64
(%)	(0.0)	(0.6)	(4.0)	(14.5)	(28.0)	(28.7)	(16.3)	(5.7)	(2.1)	(100.0)				
社会保険		24	92	321	570	548	318	111	36	2,020	25	2,045	10.05	2.69
(%)		(1.2)	(4.6)	(15.9)	(28.2)	(27.1)	(15.7)	(5.5)	(1.8)	(100.0)				
厚生連	2	44	226	657	1,353	1,308	767	272	87	4,716	157	4,873	10.12	2.71
(%)	(0.0)	(0.9)	(4.8)	(13.9)	(28.7)	(27.7)	(16.3)	(5.8)	(1.8)	(100.0)				
その他公的	2	46	201	680	1,421	1,469	833	295	96	5,043	211	5,254	10.24	2.71
(%)	(0.0)	(0.9)	(4.0)	(13.5)	(28.2)	(29.1)	(16.5)	(5.8)	(1.9)	(100.0)				
私立総合	1	48	191	511	884	957	515	204	74	3,385	72	3,457	10.05	2.80
(%)	(0.0)	(1.4)	(5.6)	(15.1)	(26.1)	(28.3)	(15.2)	(6.0)	(2.2)	(100.0)				
私立	33	867	3,842	8,467	12,987	12,295	7,162	2,836	937	49,426	1,569	50,995	9.77	2.94
(%)	(0.1)	(1.8)	(7.8)	(17.1)	(26.3)	(24.9)	(14.5)	(5.7)	(1.9)	(100.0)				
私立診療所	28	523	3,007	11,939	25,088	26,572	16,566	6,879	2,334	92,936	1,805	94,741	10.47	2.69
(%)	(0.0)	(0.6)	(3.2)	(12.8)	(27.0)	(28.6)	(17.8)	(7.4)	(2.5)	(100.0)				
総計	71	1,644	8,011	24,221	45,359	46,216	27,895	11,214	3,787	168,418	4,326	172,744	10.22	2.79
(%)	(0.0)	(1.0)	(4.8)	(14.4)	(26.9)	(27.4)	(16.6)	(6.7)	(2.2)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査