

表 2523 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別(血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)														
2年～ (%)	2 (0.0)	108 (1.0)	496 (4.6)	1,670 (15.5)	2,899 (26.8)	2,852 (26.4)	1,765 (16.3)	706 (6.5)	301 (2.8)	10,799 (100.0)	270	11,069	10.22	2.86
5年～ (%)	2 (0.0)	49 (0.4)	352 (2.8)	1,413 (11.4)	3,030 (24.4)	3,533 (28.5)	2,458 (19.8)	1,152 (9.3)	422 (3.4)	12,411 (100.0)	363	12,774	10.81	2.77
10年～ (%)		14 (0.2)	108 (1.5)	682 (9.2)	1,661 (22.5)	2,225 (30.1)	1,669 (22.6)	728 (9.9)	295 (4.0)	7,382 (100.0)	181	7,563	11.12	2.62
15年～ (%)	1 (0.0)	11 (0.2)	54 (1.2)	357 (7.8)	1,048 (22.8)	1,502 (32.7)	1,043 (22.7)	424 (9.2)	154 (3.4)	4,594 (100.0)	102	4,696	11.13	2.50
20年～ (%)		7 (0.2)	50 (1.7)	247 (8.3)	741 (24.8)	972 (32.6)	636 (21.3)	259 (8.7)	71 (2.4)	2,983 (100.0)	75	3,058	10.94	2.46
25年～ (%)		2 (0.1)	22 (1.2)	189 (10.0)	525 (27.9)	644 (34.2)	367 (19.5)	115 (6.1)	20 (1.1)	1,884 (100.0)	46	1,930	10.62	2.23
30年～ (%)		1 (0.1)	24 (2.1)	155 (13.4)	390 (33.6)	381 (32.9)	164 (14.2)	36 (3.1)	8 (0.7)	1,159 (100.0)	38	1,197	10.06	2.10
35年～ (%)		2 (0.3)	30 (4.8)	114 (18.1)	250 (39.7)	177 (28.1)	49 (7.8)	5 (0.8)	2 (0.3)	629 (100.0)	9	638	9.31	1.98
40年～ (%)		2 (1.0)	15 (7.7)	70 (35.7)	62 (31.6)	38 (19.4)	6 (3.1)	3 (1.5)		196 (100.0)	1	197	8.47	2.08
合計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.6)	10,606 (25.2)	12,324 (29.3)	8,157 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,037 (100.0)	1,085	43,122	10.69	2.70
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.6)	10,606 (25.2)	12,324 (29.3)	8,157 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,037 (100.0)	1,085	43,122	10.69	2.70
平均	7.40	6.89	8.73	10.37	11.38	11.58	11.11	10.44	9.64	11.04	10.71	11.04		
標準偏差	6.50	7.39	9.04	9.51	9.27	8.56	7.64	6.86	6.19	8.55	8.20	8.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査