

表 2524 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	1 (0.0)	51 (0.3)	268 (1.7)	1,382 (8.7)	3,646 (22.9)	4,870 (30.6)	3,488 (21.9)	1,592 (10.0)	638 (4.0)	15,936 (100.0)	390	16,326	11.12	2.64
慢性腎盂腎炎 (%)			8 (1.8)	58 (12.9)	119 (26.4)	131 (29.0)	86 (19.1)	39 (8.6)	10 (2.2)	451 (100.0)	5	456	10.74	3.02
急速進行性糸球 体腎炎 (%)		1 (0.3)	15 (5.1)	29 (9.8)	75 (25.4)	83 (28.1)	58 (19.7)	22 (7.5)	12 (4.1)	295 (100.0)		295	10.74	3.27
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			9 (2.4)	48 (12.8)	126 (33.6)	141 (37.6)	44 (11.7)	6 (1.6)	1 (0.3)	375 (100.0)	14	389	9.92	1.95
その他の分類不 能の腎炎 (%)		2 (0.8)	6 (2.5)	18 (7.6)	44 (18.5)	69 (29.0)	63 (26.5)	24 (10.1)	12 (5.0)	238 (100.0)	4	242	11.29	2.80
多発性嚢胞腎 (%)		3 (0.2)	21 (1.3)	148 (8.8)	411 (24.6)	504 (30.1)	381 (22.8)	157 (9.4)	49 (2.9)	1,674 (100.0)	34	1,708	11.01	2.55
腎硬化症 (%)	1 (0.0)	23 (0.8)	107 (3.7)	421 (14.5)	766 (26.3)	823 (28.3)	475 (16.3)	214 (7.4)	81 (2.8)	2,911 (100.0)	77	2,988	10.37	2.82
悪性高血圧 (%)		1 (0.3)	7 (2.1)	29 (8.9)	61 (18.7)	87 (26.6)	84 (25.7)	30 (9.2)	28 (8.6)	327 (100.0)	8	335	11.53	2.89
糖尿病性腎症 (%)	3 (0.0)	80 (0.6)	505 (3.7)	2,041 (15.0)	3,856 (28.3)	3,872 (28.4)	2,284 (16.8)	772 (5.7)	198 (1.5)	13,611 (100.0)	364	13,975	10.17	2.58
SLE腎炎 (%)		2 (0.5)	21 (5.8)	62 (17.0)	100 (27.4)	104 (28.5)	53 (14.5)	16 (4.4)	7 (1.9)	365 (100.0)	13	378	10.00	2.68
アミロイド腎 (%)		1 (2.1)	6 (12.8)	6 (12.8)	19 (40.4)	10 (21.3)	3 (6.4)	2 (4.3)		47 (100.0)	2	49	9.02	2.65
痛風腎 (%)		1 (0.6)	2 (1.3)	16 (10.3)	27 (17.3)	40 (25.6)	38 (24.4)	18 (11.5)	14 (9.0)	156 (100.0)	2	158	11.65	3.04
先天性代謝異常 による腎不全 (%)				2 (4.4)	7 (15.6)	16 (35.6)	9 (20.0)	8 (17.8)	3 (6.7)	45 (100.0)	1	46	11.96	2.48
腎・尿路結核 (%)			1 (3.7)	2 (7.4)	11 (40.7)	9 (33.3)	3 (11.1)	1 (3.7)		27 (100.0)	1	28	9.96	2.10
腎・尿路結石 (%)			1 (1.4)	5 (7.1)	21 (30.0)	24 (34.3)	12 (17.1)	6 (8.6)	1 (1.4)	70 (100.0)		70	10.67	2.25
腎・尿路腫瘍 (%)			2 (2.3)	10 (11.4)	22 (25.0)	24 (27.3)	20 (22.7)	7 (8.0)	3 (3.4)	88 (100.0)	2	90	10.91	2.82
閉塞性尿路障害 (%)		1 (1.0)	1 (1.0)	11 (11.5)	21 (21.9)	28 (29.2)	20 (20.8)	9 (9.4)	5 (5.2)	96 (100.0)		96	11.05	2.90
骨髄腫 (%)		2 (8.3)	1 (4.2)	5 (20.8)	5 (20.8)	4 (16.7)	4 (16.7)	2 (8.3)	1 (4.2)	24 (100.0)	1	25	9.78	3.56
腎形成不全 (%)				5 (4.0)	11 (8.9)	31 (25.0)	39 (31.5)	24 (19.4)	14 (11.3)	124 (100.0)	2	126	12.74	2.70
不明 (%)		19 (0.5)	134 (3.5)	467 (12.3)	965 (25.4)	1,064 (28.0)	699 (18.4)	331 (8.7)	126 (3.3)	3,805 (100.0)	136	3,941	10.63	2.81
再導入 (%)		2 (0.5)	1 (0.2)	27 (6.4)	81 (19.1)	131 (30.8)	95 (22.4)	61 (14.4)	27 (6.4)	425 (100.0)	11	436	11.68	2.66
その他 (%)		7 (0.7)	35 (3.7)	105 (11.2)	210 (22.3)	257 (27.3)	197 (20.9)	87 (9.2)	43 (4.6)	941 (100.0)	18	959	10.87	2.91
合計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.7)	10,604 (25.2)	12,322 (29.3)	8,155 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,031 (100.0)	1,085	43,116	10.69	2.70
記載なし (%)					2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)			6 (100.0)		6	11.27	1.63
総計 (%)	5 (0.0)	196 (0.5)	1,151 (2.7)	4,897 (11.6)	10,606 (25.2)	12,324 (29.3)	8,157 (19.4)	3,428 (8.2)	1,273 (3.0)	42,037 (100.0)	1,085	43,122	10.69	2.70

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査