

表 2525 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) 医療機関別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

医療機関	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
国公立大学			3	11	6	10	4	1		35	2	37	9.14	2.51
(%)			(8.6)	(31.4)	(17.1)	(28.6)	(11.4)	(2.9)		(100.0)				
私立大学			8	8	49	44	31	9	4	153	2	155	10.55	2.53
(%)			(5.2)	(5.2)	(32.0)	(28.8)	(20.3)	(5.9)	(2.6)	(100.0)				
国立		4	6	8	9	5	5	1	1	39		39	8.57	3.59
(%)		(10.3)	(15.4)	(20.5)	(23.1)	(12.8)	(12.8)	(2.6)	(2.6)	(100.0)				
県市町村立	1	7	42	220	448	516	345	143	47	1,769	48	1,817	10.65	2.65
(%)	(0.1)	(0.4)	(2.4)	(12.4)	(25.3)	(29.2)	(19.5)	(8.1)	(2.7)	(100.0)				
社会保険		2	5	40	92	124	75	21	15	374	14	388	10.78	2.57
(%)		(0.5)	(1.3)	(10.7)	(24.6)	(33.2)	(20.1)	(5.6)	(4.0)	(100.0)				
厚生連		3	16	96	251	266	161	73	24	890	38	928	10.65	2.55
(%)		(0.3)	(1.8)	(10.8)	(28.2)	(29.9)	(18.1)	(8.2)	(2.7)	(100.0)				
その他公的		4	14	97	211	202	129	48	18	723	35	758	10.44	2.56
(%)		(0.6)	(1.9)	(13.4)	(29.2)	(27.9)	(17.8)	(6.6)	(2.5)	(100.0)				
私立総合		5	32	133	260	296	198	80	30	1,034	14	1,048	10.61	2.74
(%)		(0.5)	(3.1)	(12.9)	(25.1)	(28.6)	(19.1)	(7.7)	(2.9)	(100.0)				
私立	2	89	420	1,333	2,569	2,928	1,860	789	251	10,241	444	10,685	10.46	2.81
(%)	(0.0)	(0.9)	(4.1)	(13.0)	(25.1)	(28.6)	(18.2)	(7.7)	(2.5)	(100.0)				
私立診療所	2	82	605	2,951	6,711	7,933	5,349	2,263	883	26,779	488	27,267	10.80	2.66
(%)	(0.0)	(0.3)	(2.3)	(11.0)	(25.1)	(29.6)	(20.0)	(8.5)	(3.3)	(100.0)				
総計	5	196	1,151	4,897	10,606	12,324	8,157	3,428	1,273	42,037	1,085	43,122	10.69	2.70
(%)	(0.0)	(0.5)	(2.7)	(11.6)	(25.2)	(29.3)	(19.4)	(8.2)	(3.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査