

表 2542 クレアチニン濃度(mg/dL) 性別（腹膜透析患者）

性別	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性 (%)	8 (0.2)	80 (2.1)	305 (7.9)	641 (16.6)	790 (20.5)	753 (19.5)	620 (16.1)	392 (10.2)	273 (7.1)	3,862 (100.0)	1,812	5,674	10.44	3.69
女性 (%)	5 (0.2)	62 (2.9)	275 (12.9)	514 (24.1)	576 (27.0)	403 (18.9)	205 (9.6)	66 (3.1)	28 (1.3)	2,134 (100.0)	961	3,095	8.84	3.07
合計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,156 (19.3)	825 (13.8)	458 (7.6)	301 (5.0)	5,996 (100.0)	2,773	8,769	9.87	3.57
記載なし (%)														
総計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,156 (19.3)	825 (13.8)	458 (7.6)	301 (5.0)	5,996 (100.0)	2,773	8,769	9.87	3.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査