

表 2544 クレアチニン濃度(mg/dL) 透析歴(年)別 (腹膜透析患者)

透析歴	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)	6 (0.2)	101 (4.1)	402 (16.3)	683 (27.7)	578 (23.5)	324 (13.2)	205 (8.3)	98 (4.0)	65 (2.6)	2,462 (100.0)	1,218	3,680	8.56	3.38
2年～ (%)	4 (0.2)	31 (1.5)	132 (6.3)	347 (16.4)	473 (22.4)	479 (22.7)	328 (15.5)	180 (8.5)	136 (6.4)	2,110 (100.0)	992	3,102	10.46	3.54
5年～ (%)	2 (0.2)	10 (0.9)	32 (3.0)	97 (9.1)	223 (20.9)	264 (24.7)	231 (21.6)	134 (12.5)	75 (7.0)	1,068 (100.0)	452	1,520	11.30	3.16
10年～ (%)	1 (0.4)		12 (4.7)	17 (6.7)	56 (22.0)	64 (25.2)	44 (17.3)	39 (15.4)	21 (8.3)	254 (100.0)	60	314	11.46	3.17
15年～ (%)				7 (10.4)	21 (31.3)	14 (20.9)	15 (22.4)	6 (9.0)	4 (6.0)	67 (100.0)	20	87	11.10	2.82
20年～ (%)				2 (12.5)	6 (37.5)	7 (43.8)	1 (6.3)			16 (100.0)	10	26	10.07	1.71
25年～ (%)			1 (11.1)		6 (66.7)	2 (22.2)				9 (100.0)	3	12	9.07	2.04
30年～ (%)				1 (20.0)	2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	1	6	9.60	1.97
35年～ (%)			1 (50.0)		1 (50.0)					2 (100.0)		2	7.35	2.33
40年～ (%)				1 (100.0)						1 (100.0)	1	2	7.90	
合計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,155 (19.3)	825 (13.8)	457 (7.6)	301 (5.0)	5,994 (100.0)	2,757	8,751	9.87	3.57
不明 (%)						1 (50.0)		1 (50.0)		2 (100.0)	16	18	13.05	1.91
記載なし (%)														
総計 (%)	13 (0.2)	142 (2.4)	580 (9.7)	1,155 (19.3)	1,366 (22.8)	1,156 (19.3)	825 (13.8)	458 (7.6)	301 (5.0)	5,996 (100.0)	2,773	8,769	9.87	3.57
平均	2.62	1.27	1.49	1.92	3.20	3.85	4.12	4.32	4.01	3.12	2.72	2.99		
標準偏差	3.69	1.69	2.79	2.91	4.11	3.83	3.64	3.48	3.26	3.66	3.28	3.55		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査