

表 2563 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	21 (0.0)	51 (0.1)	149 (0.3)	796 (1.6)	3,644 (7.2)	10,628 (21.0)	14,469 (28.6)	11,080 (21.9)	5,881 (11.6)	3,922 (7.7)	50,641 (100.0)	4,146	54,787	1.56	0.30
慢性腎盂腎炎 （％）			5 (0.3)	30 (1.9)	111 (7.0)	290 (18.2)	430 (27.0)	366 (22.9)	204 (12.8)	159 (10.0)	1,595 (100.0)	120	1,715	1.58	0.32
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	1 (0.1)		6 (0.5)	11 (0.9)	79 (6.7)	209 (17.8)	306 (26.0)	282 (24.0)	172 (14.6)	110 (9.4)	1,176 (100.0)	81	1,257	1.59	0.31
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）			2 (0.2)	6 (0.7)	18 (2.1)	82 (9.4)	202 (23.3)	277 (31.9)	166 (19.1)	115 (13.2)	868 (100.0)	63	931	1.69	0.28
その他の分類不 能の腎炎 （％）	1 (0.1)		2 (0.3)	13 (1.9)	46 (6.6)	160 (22.9)	180 (25.8)	140 (20.0)	94 (13.4)	63 (9.0)	699 (100.0)	38	737	1.57	0.31
多発性嚢胞腎 （％）	6 (0.1)	4 (0.1)	17 (0.3)	126 (2.0)	592 (9.6)	1,535 (24.9)	1,840 (29.8)	1,200 (19.4)	530 (8.6)	324 (5.2)	6,174 (100.0)	464	6,638	1.50	0.29
腎硬化症 （％）	4 (0.0)	20 (0.1)	62 (0.4)	343 (2.5)	1,457 (10.5)	3,518 (25.3)	3,952 (28.4)	2,588 (18.6)	1,257 (9.0)	706 (5.1)	13,907 (100.0)	975	14,882	1.49	0.29
悪性高血圧 （％）	1 (0.1)	1 (0.1)	6 (0.4)	45 (3.3)	147 (10.9)	357 (26.5)	356 (26.4)	240 (17.8)	116 (8.6)	80 (5.9)	1,349 (100.0)	102	1,451	1.49	0.31
糖尿病性腎症 （％）	46 (0.1)	72 (0.1)	350 (0.6)	2,130 (3.5)	8,479 (13.9)	17,814 (29.2)	17,253 (28.3)	9,277 (15.2)	3,651 (6.0)	1,868 (3.1)	60,940 (100.0)	4,952	65,892	1.43	0.28
SLE腎炎 （％）			6 (0.6)	17 (1.6)	41 (3.8)	166 (15.4)	249 (23.1)	265 (24.6)	187 (17.3)	148 (13.7)	1,079 (100.0)	89	1,168	1.65	0.32
アミロイド腎 （％）			1 (0.5)	3 (1.6)	10 (5.2)	38 (19.7)	48 (24.9)	44 (22.8)	24 (12.4)	25 (13.0)	193 (100.0)	23	216	1.61	0.33
痛風腎 （％）				11 (1.8)	62 (10.2)	165 (27.3)	190 (31.4)	114 (18.8)	39 (6.4)	24 (4.0)	605 (100.0)	47	652	1.48	0.26
先天性代謝異常 による腎不全 （％）					12 (8.7)	30 (21.7)	30 (21.7)	34 (24.6)	19 (13.8)	13 (9.4)	138 (100.0)	15	153	1.59	0.33
腎・尿路結核 （％）			2 (1.7)	4 (3.4)	9 (7.7)	21 (17.9)	28 (23.9)	33 (28.2)	12 (10.3)	8 (6.8)	117 (100.0)	6	123	1.53	0.32
腎・尿路結石 （％）	1 (0.3)		3 (1.0)	5 (1.7)	23 (7.6)	62 (20.6)	103 (34.2)	55 (18.3)	26 (8.6)	23 (7.6)	301 (100.0)	18	319	1.53	0.31
腎・尿路腫瘍 （％）	1 (0.2)	3 (0.7)	1 (0.2)	6 (1.4)	38 (8.8)	120 (27.6)	134 (30.9)	83 (19.1)	26 (6.0)	22 (5.1)	434 (100.0)	25	459	1.49	0.30
閉塞性尿路障害 （％）		1 (0.3)	1 (0.3)	14 (4.0)	28 (8.0)	76 (21.7)	79 (22.5)	80 (22.8)	28 (8.0)	44 (12.5)	351 (100.0)	26	377	1.56	0.34
骨髄腫 （％）				6 (7.7)	5 (6.4)	21 (26.9)	18 (23.1)	14 (17.9)	11 (14.1)	3 (3.8)	78 (100.0)	9	87	1.49	0.30
腎形成不全 （％）		1 (0.3)		5 (1.6)	12 (3.7)	64 (19.9)	98 (30.5)	70 (21.8)	42 (13.1)	29 (9.0)	321 (100.0)	23	344	1.59	0.31
不明 （％）	6 (0.0)	20 (0.1)	73 (0.5)	352 (2.5)	1,323 (9.4)	3,313 (23.6)	4,028 (28.8)	2,714 (19.4)	1,364 (9.7)	817 (5.8)	14,010 (100.0)	1,283	15,293	1.51	0.30
再導入 （％）	1 (0.1)		6 (0.6)	20 (2.0)	66 (6.5)	211 (20.7)	279 (27.4)	205 (20.1)	130 (12.8)	100 (9.8)	1,018 (100.0)	90	1,108	1.57	0.32
その他 （％）	4 (0.1)	8 (0.2)	19 (0.5)	94 (2.5)	325 (8.5)	852 (22.3)	1,091 (28.5)	750 (19.6)	382 (10.0)	300 (7.8)	3,825 (100.0)	327	4,152	1.53	0.32
合計 （％）	93 (0.1)	181 (0.1)	711 (0.4)	4,037 (2.5)	16,527 (10.3)	39,732 (24.9)	45,363 (28.4)	29,911 (18.7)	14,361 (9.0)	8,903 (5.6)	159,819 (100.0)	12,922	172,741	1.50	0.30
記載なし （％）					1 (33.3)			1 (33.3)		1 (33.3)	3 (100.0)		3	1.58	0.49
総計 （％）	93 (0.1)	181 (0.1)	711 (0.4)	4,037 (2.5)	16,528 (10.3)	39,732 (24.9)	45,363 (28.4)	29,912 (18.7)	14,361 (9.0)	8,904 (5.6)	159,822 (100.0)	12,922	172,744	1.50	0.30

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査