

表 2586 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	11	17	74	627	3,193	7,729	7,796	3,963	1,469	724	25,603	1,548	27,151	1.44	0.26
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.3)	(2.4)	(12.5)	(30.2)	(30.4)	(15.5)	(5.7)	(2.8)	(100.0)				
女性	6	2	27	95	526	1,717	3,409	4,131	2,825	2,257	14,995	976	15,971	1.69	0.31
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(0.6)	(3.5)	(11.5)	(22.7)	(27.5)	(18.8)	(15.1)	(100.0)				
合計	17	19	101	722	3,719	9,446	11,205	8,094	4,294	2,981	40,598	2,524	43,122	1.53	0.31
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(1.8)	(9.2)	(23.3)	(27.6)	(19.9)	(10.6)	(7.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	17	19	101	722	3,719	9,446	11,205	8,094	4,294	2,981	40,598	2,524	43,122	1.53	0.31
(%)	(0.0)	(0.0)	(0.2)	(1.8)	(9.2)	(23.3)	(27.6)	(19.9)	(10.6)	(7.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査