

表 2589 single pool Kt/V(Kt/Vsp) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	4 (0.0)	8 (0.1)	19 (0.1)	155 (1.0)	996 (6.5)	2,971 (19.3)	4,190 (27.2)	3,478 (22.5)	2,065 (13.4)	1,540 (10.0)	15,426 (100.0)	900	16,326	1.59	0.31
慢性腎盂腎炎 (%)				2 (0.5)	21 (4.8)	69 (15.8)	129 (29.5)	104 (23.7)	64 (14.6)	49 (11.2)	438 (100.0)	18	456	1.62	0.29
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			2 (0.7)	3 (1.1)	16 (5.7)	44 (15.6)	78 (27.7)	64 (22.7)	48 (17.0)	27 (9.6)	282 (100.0)	13	295	1.61	0.31
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)					11 (3.0)	26 (7.1)	70 (19.2)	108 (29.7)	84 (23.1)	65 (17.9)	364 (100.0)	25	389	1.75	0.30
その他の分類不 能の腎炎 (%)			1 (0.4)	1 (0.4)	11 (4.8)	47 (20.6)	57 (25.0)	57 (25.0)	32 (14.0)	22 (9.6)	228 (100.0)	14	242	1.61	0.31
多発性嚢胞腎 (%)		1 (0.1)	3 (0.2)	33 (2.0)	135 (8.4)	400 (24.8)	479 (29.7)	326 (20.2)	148 (9.2)	87 (5.4)	1,612 (100.0)	96	1,708	1.51	0.29
腎硬化症 (%)	6 (0.2)	2 (0.1)	4 (0.1)	46 (1.6)	265 (9.4)	715 (25.3)	813 (28.8)	518 (18.3)	263 (9.3)	192 (6.8)	2,824 (100.0)	164	2,988	1.51	0.30
悪性高血圧 (%)			1 (0.3)	17 (5.3)	30 (9.4)	69 (21.7)	109 (34.3)	56 (17.6)	20 (6.3)	16 (5.0)	318 (100.0)	17	335	1.48	0.29
糖尿病性腎症 (%)	5 (0.0)	7 (0.1)	52 (0.4)	380 (2.9)	1,778 (13.6)	3,813 (29.1)	3,702 (28.2)	2,092 (16.0)	830 (6.3)	446 (3.4)	13,105 (100.0)	870	13,975	1.44	0.28
SLE腎炎 (%)				3 (0.8)	10 (2.8)	44 (12.4)	74 (20.9)	96 (27.1)	69 (19.5)	58 (16.4)	354 (100.0)	24	378	1.72	0.32
アミロイド腎 (%)					2 (4.4)	7 (15.6)	14 (31.1)	14 (31.1)	5 (11.1)	3 (6.7)	45 (100.0)	4	49	1.59	0.25
痛風腎 (%)			1 (0.7)	5 (3.3)	22 (14.4)	40 (26.1)	40 (26.1)	28 (18.3)	8 (5.2)	9 (5.9)	153 (100.0)	5	158	1.47	0.32
先天性代謝異常 による腎不全 (%)			1 (2.3)		1 (2.3)	5 (11.6)	11 (25.6)	7 (16.3)	11 (25.6)	7 (16.3)	43 (100.0)	3	46	1.72	0.36
腎・尿路結核 (%)					4 (14.8)	4 (14.8)	5 (18.5)	8 (29.6)	3 (11.1)	3 (11.1)	27 (100.0)	1	28	1.60	0.31
腎・尿路結石 (%)					2 (2.9)	21 (30.9)	24 (35.3)	10 (14.7)	7 (10.3)	4 (5.9)	68 (100.0)	2	70	1.52	0.25
腎・尿路腫瘍 (%)				2 (2.4)	8 (9.4)	26 (30.6)	18 (21.2)	16 (18.8)	8 (9.4)	7 (8.2)	85 (100.0)	5	90	1.52	0.33
閉塞性尿路障害 (%)				2 (2.2)	8 (8.8)	26 (28.6)	19 (20.9)	17 (18.7)	12 (13.2)	7 (7.7)	91 (100.0)	5	96	1.55	0.32
骨髄腫 (%)			1 (4.5)		2 (9.1)	6 (27.3)	9 (40.9)	2 (9.1)	2 (9.1)		22 (100.0)	3	25	1.41	0.25
腎形成不全 (%)				2 (1.7)	3 (2.5)	16 (13.4)	35 (29.4)	28 (23.5)	20 (16.8)	15 (12.6)	119 (100.0)	7	126	1.65	0.31
不明 (%)	2 (0.1)	1 (0.0)	11 (0.3)	50 (1.4)	309 (8.4)	819 (22.3)	996 (27.1)	761 (20.7)	418 (11.4)	302 (8.2)	3,669 (100.0)	272	3,941	1.55	0.31
再導入 (%)			1 (0.2)		21 (5.1)	78 (18.9)	107 (26.0)	98 (23.8)	62 (15.0)	45 (10.9)	412 (100.0)	24	436	1.63	0.32
その他 (%)			4 (0.4)	21 (2.3)	64 (7.1)	198 (21.8)	224 (24.7)	206 (22.7)	114 (12.6)	76 (8.4)	907 (100.0)	52	959	1.56	0.31
合計 (%)	17 (0.0)	19 (0.0)	101 (0.2)	722 (1.8)	3,719 (9.2)	9,444 (23.3)	11,203 (27.6)	8,094 (19.9)	4,293 (10.6)	2,980 (7.3)	40,592 (100.0)	2,524	43,116	1.53	0.31
記載なし (%)						2 (33.3)	2 (33.3)		1 (16.7)	1 (16.7)	6 (100.0)		6	1.58	0.29
総計 (%)	17 (0.0)	19 (0.0)	101 (0.2)	722 (1.8)	3,719 (9.2)	9,446 (23.3)	11,205 (27.6)	8,094 (19.9)	4,294 (10.6)	2,981 (7.3)	40,598 (100.0)	2,524	43,122	1.53	0.31

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査