

表 2615 equilibrated Kt/V(eKt/V) 原疾患別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 （％）	29 (0.1)	91 (0.2)	500 (1.0)	2,947 (5.8)	10,371 (20.5)	16,130 (31.8)	11,788 (23.3)	5,576 (11.0)	2,036 (4.0)	1,195 (2.4)	50,663 (100.0)	4,124	54,787	1.36	0.28
慢性腎盂腎炎 （％）			20 (1.3)	107 (6.7)	295 (18.5)	462 (28.9)	383 (24.0)	203 (12.7)	75 (4.7)	52 (3.3)	1,597 (100.0)	118	1,715	1.38	0.30
急速進行性糸球 体腎炎 （％）	1 (0.1)	3 (0.3)	11 (0.9)	66 (5.6)	203 (17.3)	353 (30.0)	282 (24.0)	172 (14.6)	55 (4.7)	30 (2.6)	1,176 (100.0)	81	1,257	1.39	0.29
妊娠腎/妊娠中毒 症 （％）		2 (0.2)	4 (0.5)	14 (1.6)	88 (10.1)	222 (25.5)	293 (33.7)	154 (17.7)	66 (7.6)	26 (3.0)	869 (100.0)	62	931	1.48	0.27
その他の分類不 能の腎炎 （％）	1 (0.1)		13 (1.9)	32 (4.6)	147 (21.0)	214 (30.6)	147 (21.0)	93 (13.3)	36 (5.2)	16 (2.3)	699 (100.0)	38	737	1.37	0.28
多発性嚢胞腎 （％）	10 (0.2)	7 (0.1)	79 (1.3)	456 (7.4)	1,562 (25.3)	2,025 (32.8)	1,279 (20.7)	493 (8.0)	192 (3.1)	74 (1.2)	6,177 (100.0)	461	6,638	1.31	0.26
腎硬化症 （％）	5 (0.0)	41 (0.3)	234 (1.7)	1,245 (8.9)	3,595 (25.8)	4,333 (31.1)	2,749 (19.8)	1,168 (8.4)	352 (2.5)	193 (1.4)	13,915 (100.0)	967	14,882	1.30	0.27
悪性高血圧 （％）	1 (0.1)	2 (0.1)	32 (2.4)	122 (9.0)	358 (26.5)	402 (29.8)	260 (19.3)	102 (7.6)	47 (3.5)	24 (1.8)	1,350 (100.0)	101	1,451	1.30	0.28
糖尿病性腎症 （％）	62 (0.1)	159 (0.3)	1,268 (2.1)	7,018 (11.5)	18,293 (30.0)	19,471 (31.9)	9,707 (15.9)	3,413 (5.6)	1,013 (1.7)	556 (0.9)	60,960 (100.0)	4,932	65,892	1.25	0.25
SLE腎炎 （％）		5 (0.5)	10 (0.9)	37 (3.4)	169 (15.6)	271 (25.1)	291 (26.9)	176 (16.3)	77 (7.1)	44 (4.1)	1,080 (100.0)	88	1,168	1.44	0.31
アミロイド腎 （％）			2 (1.0)	7 (3.6)	38 (19.7)	58 (30.1)	43 (22.3)	23 (11.9)	16 (8.3)	6 (3.1)	193 (100.0)	23	216	1.40	0.30
痛風腎 （％）			4 (0.7)	43 (7.1)	172 (28.4)	211 (34.9)	114 (18.8)	41 (6.8)	15 (2.5)	5 (0.8)	605 (100.0)	47	652	1.29	0.24
先天性代謝異常 による腎不全 （％）				8 (5.8)	30 (21.7)	35 (25.4)	38 (27.5)	16 (11.6)	6 (4.3)	5 (3.6)	138 (100.0)	15	153	1.39	0.30
腎・尿路結核 （％）		1 (0.9)	5 (4.3)	7 (6.0)	22 (18.8)	35 (29.9)	30 (25.6)	12 (10.3)	2 (1.7)	3 (2.6)	117 (100.0)	6	123	1.33	0.30
腎・尿路結石 （％）	1 (0.3)	1 (0.3)	5 (1.7)	14 (4.7)	68 (22.6)	113 (37.5)	53 (17.6)	26 (8.6)	13 (4.3)	7 (2.3)	301 (100.0)	18	319	1.34	0.28
腎・尿路腫瘍 （％）	2 (0.5)	3 (0.7)	3 (0.7)	32 (7.4)	115 (26.5)	149 (34.3)	87 (20.0)	23 (5.3)	11 (2.5)	9 (2.1)	434 (100.0)	25	459	1.29	0.28
閉塞性尿路障害 （％）		4 (1.1)	5 (1.4)	29 (8.3)	75 (21.4)	94 (26.8)	79 (22.5)	32 (9.1)	20 (5.7)	13 (3.7)	351 (100.0)	26	377	1.35	0.32
骨髄腫 （％）			3 (3.8)	6 (7.7)	19 (24.4)	21 (26.9)	16 (20.5)	12 (15.4)	1 (1.3)		78 (100.0)	9	87	1.29	0.27
腎形成不全 （％）	1 (0.3)		2 (0.6)	9 (2.8)	67 (20.8)	101 (31.4)	80 (24.8)	38 (11.8)	12 (3.7)	12 (3.7)	322 (100.0)	22	344	1.39	0.30
不明 （％）	12 (0.1)	36 (0.3)	258 (1.8)	1,148 (8.2)	3,353 (23.9)	4,454 (31.8)	2,852 (20.4)	1,266 (9.0)	432 (3.1)	202 (1.4)	14,013 (100.0)	1,280	15,293	1.31	0.27
再導入 （％）	1 (0.1)	3 (0.3)	12 (1.2)	46 (4.5)	214 (21.0)	312 (30.6)	231 (22.7)	121 (11.9)	47 (4.6)	32 (3.1)	1,019 (100.0)	89	1,108	1.38	0.30
その他 （％）	4 (0.1)	15 (0.4)	64 (1.7)	278 (7.3)	859 (22.4)	1,205 (31.5)	784 (20.5)	376 (9.8)	154 (4.0)	89 (2.3)	3,828 (100.0)	324	4,152	1.33	0.30
合計 （％）	130 (0.1)	373 (0.2)	2,534 (1.6)	13,671 (8.6)	40,113 (25.1)	50,671 (31.7)	31,586 (19.8)	13,536 (8.5)	4,678 (2.9)	2,593 (1.6)	159,885 (100.0)	12,856	172,741	1.30	0.27
記載なし （％）				1 (33.3)		1 (33.3)		1 (33.3)			3 (100.0)		3	1.33	0.43
総計 （％）	130 (0.1)	373 (0.2)	2,534 (1.6)	13,672 (8.6)	40,113 (25.1)	50,672 (31.7)	31,586 (19.8)	13,537 (8.5)	4,678 (2.9)	2,593 (1.6)	159,888 (100.0)	12,856	172,744	1.30	0.27

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査