

表 2617 equilibrated Kt/V(eKt/V) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	17	28	332	2,375	7,694	8,912	4,188	1,376	437	259	25,618	1,533	27,151	1.26	0.24
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.3)	(9.3)	(30.0)	(34.8)	(16.3)	(5.4)	(1.7)	(1.0)	(100.0)				
女性	6	12	69	457	1,751	3,750	4,436	2,663	1,110	752	15,006	965	15,971	1.48	0.30
(%)	(0.0)	(0.1)	(0.5)	(3.0)	(11.7)	(25.0)	(29.6)	(17.7)	(7.4)	(5.0)	(100.0)				
合計	23	40	401	2,832	9,445	12,662	8,624	4,039	1,547	1,011	40,624	2,498	43,122	1.34	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(7.0)	(23.2)	(31.2)	(21.2)	(9.9)	(3.8)	(2.5)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	23	40	401	2,832	9,445	12,662	8,624	4,039	1,547	1,011	40,624	2,498	43,122	1.34	0.28
(%)	(0.1)	(0.1)	(1.0)	(7.0)	(23.2)	(31.2)	(21.2)	(9.9)	(3.8)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査