

表 2620 equilibrated Kt/V(eKt/V) 原疾患別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

原疾患	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	5 (0.0)	12 (0.1)	87 (0.6)	725 (4.7)	2,866 (18.6)	4,715 (30.5)	3,744 (24.3)	1,932 (12.5)	819 (5.3)	532 (3.4)	15,437 (100.0)	889	16,326	1.40	0.29
慢性腎盂腎炎 (%)				11 (2.5)	76 (17.3)	137 (31.2)	108 (24.6)	72 (16.4)	24 (5.5)	11 (2.5)	439 (100.0)	17	456	1.42	0.27
急速進行性糸球 体腎炎 (%)			4 (1.4)	14 (5.0)	43 (15.2)	89 (31.6)	65 (23.0)	44 (15.6)	16 (5.7)	7 (2.5)	282 (100.0)	13	295	1.40	0.29
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)				5 (1.4)	32 (8.8)	76 (20.9)	120 (33.0)	82 (22.5)	22 (6.0)	27 (7.4)	364 (100.0)	25	389	1.54	0.28
その他の分類不 能の腎炎 (%)		1 (0.4)	1 (0.4)	8 (3.5)	45 (19.7)	62 (27.2)	65 (28.5)	26 (11.4)	12 (5.3)	8 (3.5)	228 (100.0)	14	242	1.40	0.29
多発性嚢胞腎 (%)		3 (0.2)	17 (1.1)	106 (6.6)	395 (24.5)	535 (33.1)	345 (21.4)	140 (8.7)	43 (2.7)	31 (1.9)	1,615 (100.0)	93	1,708	1.33	0.27
腎硬化症 (%)	7 (0.2)	1 (0.0)	27 (1.0)	215 (7.6)	719 (25.4)	904 (32.0)	552 (19.5)	246 (8.7)	95 (3.4)	60 (2.1)	2,826 (100.0)	162	2,988	1.32	0.28
悪性高血圧 (%)			7 (2.2)	32 (10.1)	68 (21.4)	115 (36.2)	58 (18.2)	25 (7.9)	8 (2.5)	5 (1.6)	318 (100.0)	17	335	1.29	0.27
糖尿病性腎症 (%)	9 (0.1)	19 (0.1)	200 (1.5)	1,375 (10.5)	3,924 (29.9)	4,231 (32.3)	2,195 (16.7)	790 (6.0)	228 (1.7)	138 (1.1)	13,109 (100.0)	866	13,975	1.26	0.25
SLE腎炎 (%)			1 (0.3)	7 (2.0)	46 (13.0)	81 (22.8)	109 (30.7)	63 (17.7)	27 (7.6)	21 (5.9)	355 (100.0)	23	378	1.50	0.31
アミロイド腎 (%)				2 (4.4)	6 (13.3)	16 (35.6)	15 (33.3)	3 (6.7)	3 (6.7)		45 (100.0)	4	49	1.38	0.23
痛風腎 (%)			4 (2.6)	16 (10.5)	42 (27.5)	46 (30.1)	28 (18.3)	9 (5.9)	4 (2.6)	4 (2.6)	153 (100.0)	5	158	1.29	0.29
先天性代謝異常 による腎不全 (%)			1 (2.3)	1 (2.3)	3 (7.0)	12 (27.9)	12 (27.9)	7 (16.3)	4 (9.3)	3 (7.0)	43 (100.0)	3	46	1.50	0.32
腎・尿路結核 (%)				2 (7.4)	4 (14.8)	7 (25.9)	8 (29.6)	3 (11.1)	2 (7.4)	1 (3.7)	27 (100.0)	1	28	1.40	0.28
腎・尿路結石 (%)				2 (2.9)	16 (23.5)	29 (42.6)	13 (19.1)	5 (7.4)	2 (2.9)	1 (1.5)	68 (100.0)	2	70	1.32	0.23
腎・尿路腫瘍 (%)			2 (2.4)	6 (7.1)	25 (29.4)	21 (24.7)	15 (17.6)	8 (9.4)	3 (3.5)	5 (5.9)	85 (100.0)	5	90	1.33	0.32
閉塞性尿路障害 (%)			1 (1.1)	6 (6.6)	26 (28.6)	21 (23.1)	19 (20.9)	12 (13.2)	4 (4.4)	2 (2.2)	91 (100.0)	5	96	1.35	0.30
骨髄腫 (%)			1 (4.5)	1 (4.5)	8 (36.4)	8 (36.4)	3 (13.6)	1 (4.5)			22 (100.0)	3	25	1.23	0.23
腎形成不全 (%)			1 (0.8)	3 (2.5)	14 (11.8)	41 (34.5)	27 (22.7)	22 (18.5)	6 (5.0)	5 (4.2)	119 (100.0)	7	126	1.44	0.28
不明 (%)	2 (0.1)	4 (0.1)	29 (0.8)	235 (6.4)	820 (22.3)	1,128 (30.7)	802 (21.8)	390 (10.6)	156 (4.2)	106 (2.9)	3,672 (100.0)	269	3,941	1.36	0.29
再導入 (%)			1 (0.2)	13 (3.2)	71 (17.2)	126 (30.6)	105 (25.5)	53 (12.9)	23 (5.6)	20 (4.9)	412 (100.0)	24	436	1.43	0.30
その他 (%)			17 (1.9)	47 (5.2)	193 (21.3)	261 (28.7)	216 (23.8)	104 (11.5)	46 (5.1)	24 (2.6)	908 (100.0)	51	959	1.37	0.29
合計 (%)	23 (0.1)	40 (0.1)	401 (1.0)	2,832 (7.0)	9,442 (23.2)	12,661 (31.2)	8,624 (21.2)	4,037 (9.9)	1,547 (3.8)	1,011 (2.5)	40,618 (100.0)	2,498	43,116	1.34	0.28
記載なし (%)					3 (50.0)	1 (16.7)		2 (33.3)			6 (100.0)		6	1.36	0.26
総計 (%)	23 (0.1)	40 (0.1)	401 (1.0)	2,832 (7.0)	9,445 (23.2)	12,662 (31.2)	8,624 (21.2)	4,039 (9.9)	1,547 (3.8)	1,011 (2.5)	40,624 (100.0)	2,498	43,122	1.34	0.28

数値下のかつこ内は行方向の合計に対する%です。
 (C)Japanese Society for Dialysis Therapy
 2015年調査