

表 2622 nPCR(g/kg/day) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	191	5,532	33,260	44,103	16,062	2,368	257	37	6	29	101,845	7,909	109,754	0.85	0.17
(%)	(0.2)	(5.4)	(32.7)	(43.3)	(15.8)	(2.3)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
女性	118	2,868	16,079	24,431	11,890	2,481	302	36	9	22	58,236	4,754	62,990	0.88	0.19
(%)	(0.2)	(4.9)	(27.6)	(42.0)	(20.4)	(4.3)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	309	8,400	49,339	68,534	27,952	4,849	559	73	15	51	160,081	12,663	172,744	0.86	0.18
(%)	(0.2)	(5.2)	(30.8)	(42.8)	(17.5)	(3.0)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	309	8,400	49,339	68,534	27,952	4,849	559	73	15	51	160,081	12,663	172,744	0.86	0.18
(%)	(0.2)	(5.2)	(30.8)	(42.8)	(17.5)	(3.0)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査