

表 2624 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	105 (0.2)	3,385 (6.4)	18,586 (35.2)	21,799 (41.3)	7,555 (14.3)	1,168 (2.2)	139 (0.3)	14 (0.0)	5 (0.0)	20 (0.0)	52,776 (100.0)	4,079	56,855	0.84	0.17
5年～ (%)	115 (0.2)	2,823 (5.4)	16,494 (31.3)	22,585 (42.8)	9,083 (17.2)	1,462 (2.8)	165 (0.3)	24 (0.0)	4 (0.0)	9 (0.0)	52,764 (100.0)	4,059	56,823	0.86	0.17
10年～ (%)	47 (0.2)	1,176 (4.4)	7,538 (28.2)	11,710 (43.8)	5,117 (19.1)	993 (3.7)	113 (0.4)	16 (0.1)	5 (0.0)	10 (0.0)	26,725 (100.0)	2,168	28,893	0.88	0.18
15年～ (%)	22 (0.2)	531 (3.8)	3,424 (24.8)	6,241 (45.2)	2,922 (21.2)	585 (4.2)	71 (0.5)	9 (0.1)	1 (0.0)	8 (0.1)	13,814 (100.0)	1,128	14,942	0.89	0.18
20年～ (%)	12 (0.2)	243 (3.4)	1,673 (23.3)	3,181 (44.3)	1,711 (23.8)	321 (4.5)	30 (0.4)	5 (0.1)		3 (0.0)	7,179 (100.0)	599	7,778	0.90	0.18
25年～ (%)	5 (0.1)	125 (3.4)	863 (23.7)	1,612 (44.3)	840 (23.1)	170 (4.7)	21 (0.6)	5 (0.1)			3,641 (100.0)	343	3,984	0.90	0.18
30年～ (%)	2 (0.1)	67 (3.4)	436 (22.4)	869 (44.6)	471 (24.2)	87 (4.5)	14 (0.7)			1 (0.1)	1,947 (100.0)	167	2,114	0.91	0.18
35年～ (%)		41 (4.2)	249 (25.4)	427 (43.6)	205 (20.9)	53 (5.4)	5 (0.5)				980 (100.0)	90	1,070	0.89	0.18
40年～ (%)	1 (0.4)	9 (3.5)	76 (29.8)	110 (43.1)	48 (18.8)	10 (3.9)	1 (0.4)				255 (100.0)	30	285	0.87	0.18
合計 (%)	309 (0.2)	8,400 (5.2)	49,339 (30.8)	68,534 (42.8)	27,952 (17.5)	4,849 (3.0)	559 (0.3)	73 (0.0)	15 (0.0)	51 (0.0)	160,081 (100.0)	12,663	172,744	0.86	0.18
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	309 (0.2)	8,400 (5.2)	49,339 (30.8)	68,534 (42.8)	27,952 (17.5)	4,849 (3.0)	559 (0.3)	73 (0.0)	15 (0.0)	51 (0.0)	160,081 (100.0)	12,663	172,744	0.86	0.18
平均	7.97	7.63	8.01	9.03	9.93	10.66	10.72	11.04	7.53	9.22	8.85	9.13	8.87		
標準偏差	6.14	6.31	6.53	7.04	7.45	7.71	7.87	6.96	4.85	7.11	6.99	7.26	7.01		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査