

表 2641 nPCR(g/kg/day) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	30	939	7,735	11,693	4,458	691	78	12	2	5	25,643	1,508	27,151	0.87	0.17
(%)	(0.1)	(3.7)	(30.2)	(45.6)	(17.4)	(2.7)	(0.3)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
女性	17	485	3,646	6,541	3,494	756	80	11	1	1	15,032	939	15,971	0.90	0.18
(%)	(0.1)	(3.2)	(24.3)	(43.5)	(23.2)	(5.0)	(0.5)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
合計	47	1,424	11,381	18,234	7,952	1,447	158	23	3	6	40,675	2,447	43,122	0.88	0.17
(%)	(0.1)	(3.5)	(28.0)	(44.8)	(19.6)	(3.6)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	47	1,424	11,381	18,234	7,952	1,447	158	23	3	6	40,675	2,447	43,122	0.88	0.17
(%)	(0.1)	(3.5)	(28.0)	(44.8)	(19.6)	(3.6)	(0.4)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査