

表 2643 nPCR(g/kg/day) 透析歴(年)別 (血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析歴	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2年未満 (%)															
2年～ (%)	21 (0.2)	511 (4.9)	3,459 (33.1)	4,564 (43.7)	1,585 (15.2)	250 (2.4)	39 (0.4)	6 (0.1)		2 (0.0)	10,437 (100.0)	632	11,069	0.85	0.17
5年～ (%)	11 (0.1)	461 (3.8)	3,522 (29.3)	5,380 (44.8)	2,190 (18.2)	397 (3.3)	33 (0.3)	8 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)	12,004 (100.0)	770	12,774	0.87	0.17
10年～ (%)	6 (0.1)	225 (3.2)	1,910 (26.8)	3,189 (44.7)	1,506 (21.1)	262 (3.7)	33 (0.5)	5 (0.1)	2 (0.0)		7,138 (100.0)	425	7,563	0.89	0.17
15年～ (%)	4 (0.1)	102 (2.3)	1,032 (23.2)	2,047 (46.0)	1,048 (23.6)	199 (4.5)	14 (0.3)	2 (0.0)			4,448 (100.0)	248	4,696	0.91	0.17
20年～ (%)	4 (0.1)	60 (2.1)	643 (22.2)	1,325 (45.7)	718 (24.8)	139 (4.8)	8 (0.3)			1 (0.0)	2,898 (100.0)	160	3,058	0.91	0.17
25年～ (%)		29 (1.6)	374 (20.4)	849 (46.4)	461 (25.2)	99 (5.4)	16 (0.9)	1 (0.1)		1 (0.1)	1,830 (100.0)	100	1,930	0.93	0.18
30年～ (%)	1 (0.1)	18 (1.6)	238 (21.3)	514 (46.0)	273 (24.4)	61 (5.5)	12 (1.1)			1 (0.1)	1,118 (100.0)	79	1,197	0.93	0.18
35年～ (%)		16 (2.6)	150 (24.4)	275 (44.8)	135 (22.0)	34 (5.5)	3 (0.5)	1 (0.2)			614 (100.0)	24	638	0.91	0.18
40年～ (%)		2 (1.1)	53 (28.2)	91 (48.4)	36 (19.1)	6 (3.2)					188 (100.0)	9	197	0.89	0.15
合計 (%)	47 (0.1)	1,424 (3.5)	11,381 (28.0)	18,234 (44.8)	7,952 (19.6)	1,447 (3.6)	158 (0.4)	23 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	40,675 (100.0)	2,447	43,122	0.88	0.17
不明 (%)															
記載なし (%)															
総計 (%)	47 (0.1)	1,424 (3.5)	11,381 (28.0)	18,234 (44.8)	7,952 (19.6)	1,447 (3.6)	158 (0.4)	23 (0.1)	3 (0.0)	6 (0.0)	40,675 (100.0)	2,447	43,122	0.88	0.17
平均	8.66	8.61	9.94	11.18	12.39	13.21	12.96	10.17	9.00	15.83	11.06	10.70	11.04		
標準偏差	7.14	7.25	8.14	8.59	8.80	9.13	9.64	8.15	1.73	12.86	8.55	8.34	8.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査