

表 2664 %クレアチニン産生速度(%) 性別（施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	7,634	5,731	8,807	12,548	15,544	16,690	14,708	10,369	5,690	4,060	101,781	7,973	109,754	98.61	25.77
(%)	(7.5)	(5.6)	(8.7)	(12.3)	(15.3)	(16.4)	(14.5)	(10.2)	(5.6)	(4.0)	(100.0)				
女性	5,186	3,152	4,994	6,947	8,663	9,279	8,430	6,025	3,387	2,125	58,188	4,802	62,990	97.82	26.59
(%)	(8.9)	(5.4)	(8.6)	(11.9)	(14.9)	(15.9)	(14.5)	(10.4)	(5.8)	(3.7)	(100.0)				
合計	12,820	8,883	13,801	19,495	24,207	25,969	23,138	16,394	9,077	6,185	159,969	12,775	172,744	98.32	26.07
(%)	(8.0)	(5.6)	(8.6)	(12.2)	(15.1)	(16.2)	(14.5)	(10.2)	(5.7)	(3.9)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	12,820	8,883	13,801	19,495	24,207	25,969	23,138	16,394	9,077	6,185	159,969	12,775	172,744	98.32	26.07
(%)	(8.0)	(5.6)	(8.6)	(12.2)	(15.1)	(16.2)	(14.5)	(10.2)	(5.7)	(3.9)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査