

表 2684 %クレアチニン産生速度(%) 性別（血液透析濾過患者 透析回数週3回 透析歴2年以上）

性別	60未満	60～	70～	80～	90～	100～	110～	120～	130～	140～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
男性	1,236	1,204	1,983	3,024	4,025	4,542	4,019	2,937	1,559	1,103	25,632	1,519	27,151	101.63	24.08
(%)	(4.8)	(4.7)	(7.7)	(11.8)	(15.7)	(17.7)	(15.7)	(11.5)	(6.1)	(4.3)	(100.0)				
女性	783	686	1,051	1,802	2,293	2,619	2,443	1,738	981	631	15,027	944	15,971	101.82	24.19
(%)	(5.2)	(4.6)	(7.0)	(12.0)	(15.3)	(17.4)	(16.3)	(11.6)	(6.5)	(4.2)	(100.0)				
合計	2,019	1,890	3,034	4,826	6,318	7,161	6,462	4,675	2,540	1,734	40,659	2,463	43,122	101.70	24.12
(%)	(5.0)	(4.6)	(7.5)	(11.9)	(15.5)	(17.6)	(15.9)	(11.5)	(6.2)	(4.3)	(100.0)				
記載なし															
(%)															
総計	2,019	1,890	3,034	4,826	6,318	7,161	6,462	4,675	2,540	1,734	40,659	2,463	43,122	101.70	24.12
(%)	(5.0)	(4.6)	(7.5)	(11.9)	(15.5)	(17.6)	(15.9)	(11.5)	(6.2)	(4.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査