

表 2704 糖尿病の有無 治療方法別（透析患者全体）

治療方法	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
施設血液透析 (%)	98,018 (45.2)	118,696 (54.8)	216,714 (100.0)	32,005	6	248,725
血液透析濾過 (%)	23,587 (51.3)	22,408 (48.7)	45,995 (100.0)	7,780	1	53,776
血液濾過 (%)	6 (50.0)	6 (50.0)	12 (100.0)	4		16
血液吸着透析 (%)	1,022 (88.0)	139 (12.0)	1,161 (100.0)	215		1,376
在宅血液透析 (%)	337 (74.2)	117 (25.8)	454 (100.0)	101		555
腹膜透析 (%)	3,497 (50.0)	3,504 (50.0)	7,001 (100.0)	1,768		8,769
合計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217
記載なし (%)						
総計 (%)	126,467 (46.6)	144,870 (53.4)	271,337 (100.0)	41,873	7	313,217

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

\*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往が有りの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査