

表 2706 糖尿病の有無 併用の状況別（透析患者全体）

併用の状況	糖尿病なし	糖尿病あり	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独	122,833	141,254	264,087	40,069	7	304,163
(%)	(46.5)	(53.5)	(100.0)			
PD単独	2,726	2,881	5,607	1,497		7,104
(%)	(48.6)	(51.4)	(100.0)			
HD(F)単独.PDカテ あり	91	68	159	23		182
(%)	(57.2)	(42.8)	(100.0)			
PD.HD併用週1	675	551	1,226	244		1,470
HD(F)	(55.1)	(44.9)	(100.0)			
PD.HD併用週2	81	65	146	26		172
HD(F)	(55.5)	(44.5)	(100.0)			
PD.HD併用週3	12	13	25	4		29
HD(F)	(48.0)	(52.0)	(100.0)			
PD.HD併用週4						
HD(F)						
(%)						
PD.HD併用その他	37	24	61	10		71
(%)	(60.7)	(39.3)	(100.0)			
合計	126,455	144,856	271,311	41,873	7	313,191
(%)	(46.6)	(53.4)	(100.0)			
不明	12	13	25			25
(%)	(48.0)	(52.0)	(100.0)			
記載なし		1	1			1
(%)		(100.0)	(100.0)			
総計	126,467	144,870	271,337	41,873	7	313,217
(%)	(46.6)	(53.4)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査