

表 2708 糖尿病の有無 年齢(歳)別 (透析患者全体)

| 年齢 | 糖尿病なし | 糖尿病あり | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|---------|
| 15歳未満 (%) | 68 (95.8) | 3 (4.2) | 71 (100.0) | 32 | | 103 |
| 15歳～ (%) | 687 (90.8) | 70 (9.2) | 757 (100.0) | 213 | | 970 |
| 30歳～ (%) | 6,964 (59.5) | 4,736 (40.5) | 11,700 (100.0) | 2,155 | 1 | 13,856 |
| 45歳～ (%) | 23,059 (47.1) | 25,919 (52.9) | 48,978 (100.0) | 7,363 | | 56,341 |
| 60歳～ (%) | 53,880 (43.5) | 69,955 (56.5) | 123,835 (100.0) | 17,796 | 3 | 141,634 |
| 75歳～ (%) | 38,958 (47.8) | 42,473 (52.2) | 81,431 (100.0) | 13,314 | 3 | 94,748 |
| 90歳～ (%) | 2,850 (62.5) | 1,711 (37.5) | 4,561 (100.0) | 999 | | 5,560 |
| 合計 (%) | 126,466 (46.6) | 144,867 (53.4) | 271,333 (100.0) | 41,872 | 7 | 313,212 |
| 不明 (%) | | 3 (100.0) | 3 (100.0) | 1 | | 4 |
| 記載なし (%) | 1 (100.0) | | 1 (100.0) | | | 1 |
| 総計 (%) | 126,467 (46.6) | 144,870 (53.4) | 271,337 (100.0) | 41,873 | 7 | 313,217 |
| 平均 | 67.62 | 68.01 | 67.83 | 68.03 | 69.71 | 67.86 |
| 標準偏差 | 13.37 | 11.42 | 12.37 | 13.26 | 15.09 | 12.49 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*糖尿病ありとは、原疾患が糖尿病性腎症または、糖尿病の既往がありの患者。

糖尿病なしとは、原疾患が糖尿病性腎症以外で且つ糖尿病の既往がなしの患者。

記載なしとは、原疾患と糖尿病の既往いずれも記載のなかった患者。

不明とは、上記以外。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査